สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง กรมทางหลวง
โทรศัพท์หมายเลข 0-2354-6485-86
โทรสารหมายเลข 0-2354-1041

คู่มือพืชพันธุ์ที่ใช้ในงานภูมิทัศน์ทางหลวง

คู่มือพืชพันธุ์ที่ใช้ในงาน
ภูมิทัศน์ทางหลวง

จัดทำโดย สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง กรมทางหลวง

สารบัญ

ไม้ระดับสูง (ไม้ยืนต้น): Tall Plants	หน้า
กระดังงาไทย	6
กระถินเทพา	6
กระทิง (สารภีทะเล)	7
กระพี้จั่น ปี้จั่น	7
กันเกรา (มันปลา ตำเสา)	8
กัลปพฤกษ์	8
กาสะลองคำ ปีบทอง	9
กุ่มบก	9
ข่อย	10
ขี้เหล็กอเมริกัน	10
คอร์เดีย	11
แคนา	11
แคแสด	12
งิ้ว	12
ชงโค; เสี้ยว	13
ตะแบกนา	13
ตาเบเหลือง (เหลืองปรีดียาธร)	14
ตีนเป็ดฝรั่ง	14
แตรชมพู	15
ทองกวาว	15
ทองหลางด่าง	16
ไทรด่าง	16
ไทรย้อยใบแหลม	17
ไทรอิเรกูล่า	17
นนทรี	18
ประดู่แดง	18
ปาล์มหางหมาจิ้งจอก	19
ปีบ	19
แปรงล้างขวด	20
พญาสัตบรรณ	20
พิกุล	21
มะขาม	21
มะรุม	22
มะฮอกกานีใบเล็ก	22
มะฮอกกานีใบใหญ่	23
รัตมา	23
ราชพฤกษ์ (คูน)	24
ลั่นทม (ลีลาวดี)	24
ลั่นทมใบลูกศร	25

ไม้ระดับสูง (ไม้ยืนต้น): Tall Plants	หน้า
ลำดวน	25
ศรีตรัง	26
สนดินสอ	26
สนมังกร	27
สะเดาบ้าน	27
สาเก	28
สารภี	28
สุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ)	29
เสลาใบใหญ่ (อินทรชิต)	29
โสกน้ำ	30
โสกเหลือง (ศรียะลา)	30
หมากเยอรมัน (หมากนวล หมากมนิลา)	31
หลิว	31
หลิวทอง	32
หูกระจง	32
เหลืองอินเดีย	33
อโศกอินเดีย (อโศกเซนคาเบรียล)	33
อินทนิลน้ำ	34
อินทนิลบก	34
ไม้พุ่มสูง (ไม้ระดับกลาง-ใหญ่): Medium Plants - Large	**หน้า**
กรรณิการ์	36
กาหลง	36
แก้ว	36
แก้วเจ้าจอม	37
เข็มกุดั่น	37
เข็มขาว	37
เข็มสามสี	38
จั๋งจีน	38
ดอนญ่าขาว (ดอนญ่าออโรร่า)	38
ทรงบาดาล	39
ทองอุไร	39
เทียนหยด (ช่อม่วง)	39
ไทรทอง	40
นีออน	40
ประยงค์	40
พู่จอมพล	41
พู่ชมพู	41
มะขามเทศด่าง	41
มิกกี้เม้าส์	42

ไม้พุ่มสูง (ไม้ระดับกลาง-ใหญ่): Medium Plants - Large	หน้า
โมก โมกลา	42
ยี่โถ	42
โยทะกา	43
รำเพย	43
สนบลู	43
หมากเขียว	44
หมากเหลือง	44
หางนกยูงไทย	44
ไม้พุ่มกลาง (ไม้ระดับกลาง-เล็ก): Medium Plants - Small	**หน้า**
ก้ามกุ้ง	46
โกสน	46
ขาไก่เขียว	46
ขาไก่ด่าง	47
ขาไก่ไทย	47
ข้าวตอกพระร่วง	47
เข็มเชียงใหม่; เข็มญี่ปุ่น	48
เข็มพิษณุโลก	48
เข็มเศรษฐี	48
เข็มเหลือง	49
ชบา	49
ชบาจิ๋ว	49
ชบาด่าง 3 สี	50
ชวนชม	50
ช้องนาง	50
ชาฮกเกี้ยน	51
เทียนทอง	51
เทียนหยดแคระ	51
เทียนหยดด่าง (ชาด่าง)	52
บลูฮาวาย	52
บานเช้าสีเหลือง (บานเช้าต้น)	52
บานบุรีแคระ	53
บานไม่รู้โรยฝรั่ง	53
ใบเงิน; ใบทอง; ใบนาก 1	53
ใบเงิน; ใบทอง; ใบนาก 2	54
ประทัดจีน (ประทัดแตก)	54
ประทัดไต้หวัน	54
ปัตตาเวีย (ปัตตาเวียใบแฉก)	55
ผกากรองต้น	55
พุทธรักษา	55

ไม้พุ่มกลาง (ไม้ระดับกลาง-เล็ก): Medium Plants - Small	หน้า
พวงทองต้น	56
เฟื่องฟ้า	56
มะผู้มะเมีย (หมากผู้หมากเมีย)	56
ลิ้นกระบือ	57
เล็บครุฑ	57
แสยก	57
หนวดปลาหมึกแคระ	58
หีบไม้งาม	58
เอื้องทอง (กนกลายไทย)	58
ไม้พุ่มเตี้ย (ไม้ระดับต่ำ-ใหญ่): Low Plants - Large	**หน้า**
กาบหอยแครง; กาบหอยแครงแคระ	60
การะเกดหนู	60
กำแพงเงิน	60
ซุ้มกระต่ายเขียว	61
ผักโขมแดง	61
ไผ่ฟิลิปปินส์ด่าง	61
พลับพลึงหนู	62
แพงพวยฝรั่ง	62
ฤาษีผสม	62
ว่านสี่ทิศด่าง (รางทอง)	63
เศรษฐีไซ่ง่อน (ซุ้มกระต่ายด่าง)	63
หลิวไต้หวัน	63
ไม้พุ่มเตี้ย (ไม้ระดับต่ำ-เล็ก): Low Plants - Small	**หน้า**
กระดุมทองเลื้อย	64
ก้ามปูหลุด	64
เกล็ดแก้ว	64
ดาดตะกั่ว	65
บุษบาฮาวาย	65
ปีกแมลงสาป	65
ผกากองเลื้อย	66
ผักเป็ดเขียว, ผักเป็ดแดง	66
พอทูลาก้า, แพรเซี่ยงไฮ้	66
ฟ้าประดิษฐ์	67
หนวดปลาดุก, หนวดปลาดุกแคระ	67
หัวใจม่วง	67
บรรณานุกรม :	68
ภาคผนวก :	69

คำนำ

กรมทางหลวงมีภารกิจตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง ซึ่งกรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างและบูรณะปรับปรุงทางหลวงเพื่อให้ผู้ใช้ทางหลวงมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงนั้น กรมทางหลวงจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ควบคู่กันไปด้วย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว อันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน

ในการดำเนินการปลูกต้นไม้ บริเวณเกาะกลางและพื้นที่สองข้างทางหลวงนั้น การเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมมาปลูกถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งยังมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัย ความสวยงามของภูมิทัศน์ การช่วยลดภาวะโลกร้อน หรือการสะท้อนถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม และรู้ถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะของพันธุ์ไม้ที่ใช้ในงานภูมิทัศน์ทางหลวง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามเพื่อให้ต้นไม้ในเขตทางหลวงเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือคู่มือพืชพันธุ์ที่ใช้ในงานภูมิทัศน์ทางหลวงเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ศึกษาเพื่อการเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับงานภูมิทัศน์ในท้องถิ่นของท่าน รวมถึงเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจด้านพันธุ์ไม้ที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทย โดยได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เอกสารทางวิชาการ และหนังสือพันธุ์ไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่พร้อมภาพประกอบที่ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่างๆ มา ณ ที่นี้ด้วย

ไม้ระดับสูง (ไม้ยืนต้น)

Tall Plants



1. กระดังงาไทย

ชื่อสามัญ : Kenanga, Ylang Ylang
ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cananga odorata (Lam.) Hook. f.& Thomson var. odorata

ลักษณะ

รูปทรง	ปิรามิด	ใบ	สีเขียว
ความสูง	8 - 20 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	3 - 4 ม.	ดอก	สีเหลืองแกมเขียวอ่อน
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	หอมแรง
ลำต้น	สีน้ำตาล	ช่วงการมีดอก	ตลอดปี

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	หนอนชอนใบ

อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3.5 - 4 ม. ห่าง 6 - 8 ม.

การใช้งาน :
- ไม่นิยมปลูกประดับสวนเพราะต้นสูงมาก เหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการไม้โตเร็ว ลักษณะเป็นธรรมชาติ เช่น รีสอร์ท สวนสาธารณะ
- ดอกใช้ทำเครื่องหอม ทำน้ำอบ ปรุงขนม

2. กระถินเทพา

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : RABACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acacia mangium Willd

ลักษณะ

รูปทรง	-	ใบ	มีใบจริงประเภทใบรวม ประกอบด้วยใบย่อยหลายใบ
ความสูง	5 - 12 ม.		
ขนาดทรงพุ่ม	5 - 8 ม.		
ผิวสัมผัส	-	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ลำต้น	เปลือกแข็งหนาขรุขระ แตกเป็นร่องยาว	ดอก	สีขาว - ครีม - เหลือง
		กลิ่น	กลิ่นหอมอ่อนๆ
		ช่วงการมีดอก	ตลอดปี

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทุกประเภท	ความชื้น	-
แสง	แดดเต็มที่	โรค/แมลง	ด้วงเจาะก้าน

อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : 3 x 3 ม.

การใช้งาน :
- ต้นจะเล็กกว่ากระถินณรงค์ ปลูกเป็นไม้ริมถนน
- นำเข้ามาในไทยและปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจทางภาคอีสาน เพื่อแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพ





3. กระทิง (สารภีทะเล)

ชื่อสามัญ : Alexandrial laurel, Beauty-leaf
ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calophyllum inophyllum L.

ลักษณะ

รูปทรง	กลม	ใบ	ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวนวล
ความสูง	5-20 ม.		
ขนาดทรงพุ่ม	6-8 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ผิวสัมผัส	หยาบ	ดอก	สีขาว
ลำต้น	เรียบ สีน้ำตาลปนเทา	กลิ่น	หอมอ่อนๆ
		ช่วงการมีดอก	ต.ค. – ธ.ค.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป ทนดินเค็ม	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน - ร่ม	โรค/แมลง	-

อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 4 ม. ห่าง 5 – 8 ม.

การใช้งาน :
- ทรงพุ่มและใบสวยงาม ปลูกให้ร่มเงาได้ดี
- ใช้เป็นไม้ประดับในอาคาร
- ชอบขึ้นตามชายป่าริมทะเลหรือบริเวณโขดหิน รากชอนไช ไม่ควรปลูกในบ้าน

4. กระพี้จั่น ปี้จั่น

ชื่อสามัญ : พี้จั่น
ชื่อวงศ์ : LEG. - PAPILIONOIDEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millettia brandisiana Kurz

ลักษณะ

รูปทรง	กลม	ใบ	สีเขียว พุ่มทึบ
ความสูง	8 - 20 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	6 – 8 ม.	ดอก	สีขาวปนม่วง กลีบรองดอกสีม่วงเข้มเกือบดำ
ผิวสัมผัส	ละเอียด		
ลำต้น	เปลือกสีน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ	กลิ่น	-
		ช่วงการมีดอก	มี.ค - พ.ค

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	หนอนเจาะกลางลำต้นและกิ่ง

อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3-4 ม. ห่าง 5-8 ม.

การใช้งาน :
- ไม่ควรให้รากกระทบกระเทือนขณะปลูกใหม่ต้นอาจตายได้ เมื่อเจริญเติบโตแล้วจะเลี้ยงง่าย ค้ำยัน 2 – 3 ปี ถ้าต้น Ø 6"
- ทรงพุ่มและใบสวยงาม ดอกสวย นิยมปลูกในบ้าน ริมถนน
- สามารถจัดหาได้เป็นปริมาณมากทุกขนาดที่ต้องการ
- เป็นไม้สวนครัว ดอกดองกินจิ้มน้ำพริก





5. กันเกรา (มันปลา ตำเสา)

ชื่อสามัญ : Common tembusu
ชื่อวงศ์ : GENTIANACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fagraea fragraes Roxb.

ลักษณะ

รูปทรง	ไข่	ใบ	สีเขียวเข้มเป็นมัน พุ่มใบหนาทึบ
ความสูง	8 - 25 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	4 - 6 ม.	ดอก	เริ่มบานสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนวลอมแสด
ผิวสัมผัส	ละเอียด		
ลำต้น	สีน้ำตาลเข้ม เปลือกหยาบ แตกเป็นร่องลึก	กลิ่น	หอมตลอดวัน
		ช่วงการมีดอก	ก.ค. – ส.ค.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	เพลี้ยไฟ ทำให้ใบห่อ

อัตราการเจริญเติบโต : ช้า
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 4 ม. ห่าง 6 – 8 ม.

การใช้งาน :
- ขึ้นได้ในที่แล้ง และที่ฝนตกชุก
- พุ่มใบแน่นและให้ร่มเงาได้ดี ดอกสวยงามและมีกลิ่นหอม
- เปลือกลำต้นแตกเป็นร่องลึกสวยงาม

6. กัลปพฤกษ์

ชื่อสามัญ : Pink shower, Pink cassia
ชื่อวงศ์ : LEG. – CAESALPINIOIDEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia bakeriana Craib

ลักษณะ

รูปทรง	แผ่กว้าง		
ความสูง	5 – 15 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	7 - 8 ม.	ดอก	สีชมพู เปลี่ยนจากชมพูเข้มเป็นขาว
ผิวสัมผัส	ละเอียด		
ลำต้น	สีเทา	กลิ่น	-
ใบ	สีเขียวเข้ม ใบมีขน ทิ้งใบก่อนและขณะออกดอก	ช่วงการมีดอก	ออกดอกอายุ 3 - 8 ปี, ก.พ. - เม.ย.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ร่วน และดินทุกชนิด	ความชื้น	ต่ำ
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	หนอนชอนฝัก

อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 4 – 5 ม. ห่าง 6 – 9 ม.

การใช้งาน :
- ปลูกในที่โล่ง รูปทรงสวย เวลามีดอกเต็มต้นสวยสะดุดตา
- เหมาะในที่สวนสาธารณะ หรือปลูกริมถนน
- ดอกบานจากสีชมพูเข้ม แล้วเปลี่ยนเป็นสีขาว
- ผลเป็นฝักยาวสีน้ำตาลเข้ม มีขนนิ่ม
- เป็นไม้ถิ่นเดียวของไทย







7. กาสะลองคำ ; ปีบทอง

ชื่อสามัญ : Tree jasmine
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Radermachera ignea (Kurz) Steenis

ลักษณะ

รูปทรง	ไข่	ใบ	สีเขียว
ความสูง	6 – 15 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	6 – 8 ม.	ดอก	สีเหลืองอมส้มหรือสีส้ม
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	-
ลำต้น	สีน้ำตาล	ช่วงการมีดอก	ม.ค. – เม.ย.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง-มาก
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	-

อัตราการเจริญเติบโต : ช้า
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 4 ม. ห่าง 6 – 8 ม.

การใช้งาน :
- ชอบอากาศแห้งและเย็น
- ทรงพุ่มไม่แผ่กว้างจึงไม่ให้ร่มเงามากนัก ทรงพุ่มไม่แผ่สวยงามเท่าปีบ
- ทรงพุ่มแน่น ใบมันและใบลู่ลง

8. กุ่มบก

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : CAPPARACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crateva adansonii DC. ssp. trifoliata (Roxb.) Jacobs

ลักษณะ

รูปทรง	กลม	ใบ	สีเขียว ใบป้อม สั้นกว่ากุ่มน้ำ
ความสูง	5 – 15 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	5 – 8 ม.	ดอก	สีขาว เปลี่ยนเป็นสีนวลเกสรสีม่วง
ผิวสัมผัส	หยาบ		
ลำต้น	สีน้ำตาล	กลิ่น	-
		ช่วงการมีดอก	ก.พ. – มิ.ย. ทิ้งใบหมดต้นเมื่อออกดอก

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	-

อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง – ช้า
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 5 ม. ห่าง 6 – 8 ม.

การใช้งาน :
- ชอบที่แห้งแล้ง
- ปลูกเป็นจุดเด่นบริเวณทางเข้าบ้าน เหมาะปลูกในบ้านเพราะโตช้า





9. ข่อย

ชื่อสามัญ : Siamese rough bush
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Streblus asper Lour

ลักษณะ

รูปทรง	ไข่	ใบ	สีเขียว ใบหนาและสากมือทั้ง 2 ด้าน
ความสูง	10 – 20 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	5 – 6 ม.	ดอก	สีดอกเพศเมียสีขาวเหลืองอ่อน
ผิวสัมผัส	ละเอียด		ดอกเพศผู้สีเขียวอ่อน
ลำต้น	สีเทา ขรุขระ	กลิ่น	-
		ช่วงการมีดอก	ม.ค. - ก.พ.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ร่วน ดินปนทราย	ความชื้น	ปานกลาง - ต่ำ
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	-

อัตราการเจริญเติบโต : ช้า
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ ทำรั้ว 0.15 – 0.03 ม. ห่าง ทำรั้ว 0.4 – 0.6 ม.
ไม้ดัด 1.5 – 2 ม. ไม้ดัด 3 – 4 ม.
รูปทรงอิสระ 4 – 5 ม. รูปทรงอิสระ 6 – 8 ม.

การใช้งาน :
- ทนอากาศร้อนและแห้งได้ดี ขึ้นได้ใกล้ทะเลและทั่วไป
- นิยมปลูกเป็น 3 แบบ 1.เป็นรั้ว เพราะพุ่มแน่นจากโคนถึงยอด
  2.เป็นไม้ประดิษฐ์รูปทรงต่างๆ (topiary)
  3.เป็นไม้ดัดไทย ใช้เวลา 6 – 7 ปี จึงได้ช่อขนาด 30 – 50 ซม.
- ทนน้ำท่วมได้ในระยะหนึ่ง

10. ขี้เหล็กอเมริกัน

ชื่อสามัญ : Popcorn bush
ชื่อวงศ์ : LEG. – CAESALPINIOIDEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Senna spectabilis (DC.) Irwin & Barneby

ลักษณะ

รูปทรง	แผ่กว้าง	ใบ	สีเขียว
ความสูง	3 – 20 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	4 – 6 ม.	ดอก	สีเหลือง
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	-
ลำต้น	สีน้ำตาล	ช่วงการมีดอก	พ.ย. – ก.พ.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	หนอนกัดกินใบ ราดำ

อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 4 ม. ห่าง 6 – 8 ม.

การใช้งาน :
- นิยมปลูกในที่สาธารณะมากกว่าในบ้าน เพราะมีขนาดใหญ่
- นิยมปลูกริมถนน
- ดอกเป็นกลุ่มใหญ่สะดุดตามากกว่าทรงบาดาล
- เลี้ยงง่าย





11. คอร์เดีย

ชื่อสามัญ : Geiger tree, Cordia
ชื่อวงศ์ : BORAGINACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cordia sebestean L.

ลักษณะ

รูปทรง	ไข่ ไข่กว้าง	ใบ	สีเขียว มีขนสาก
ความสูง	3 – 8 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	3 – 4 ม.	ดอก	สีแสด รูปกรวย
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	-
ลำต้น	สีน้ำตาลอ่อน	ช่วงการมีดอก	ตลอดปี

ลักษณะนิสัย

ดิน	อุดมสมบูรณ์	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	หนอนเจาะลำต้น

อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 2 – 3 ม. ห่าง 4 – 5 ม.

การใช้งาน :
- ปลูกในที่ขนาดเล็ก ปลูกใกล้ทะเลได้
- สามารถปลูกไม้อื่นๆ ใต้ต้นได้
- มีดอกตลอดปี

12. แคนา

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Doilchandrone serrulata (DC) Seem.

ลักษณะ

รูปทรง	รูปไข่	ใบ	ใบรูปรีแกมรูปไข่กลับ
ความสูง	10-20 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	-	ดอก	สีขาว
ผิวสัมผัส	-	กลิ่น	-
ลำต้น	สีน้ำตาลอมเทา	ช่วงการมีดอก	ก.พ. - มี.ค.

ลักษณะนิสัย

ดิน	-	ความชื้น	-
แสง	-	โรค/แมลง	-

อัตราการเจริญเติบโต : -
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : -

การใช้งาน :
- ทรงพุ่มใบและฝักสวย ปลูกให้ร่มเงาและเป็นจุดเด่นให้สวยได้
- ดอกและยอดรับประทานได้



13. แคแสด

ชื่อสามัญ : African tulip tree
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spathodea campanulata P. Beauv

ลักษณะ

รูปทรง	ไข่	ใบ	สีเขียวเข้มเป็นมัน
ความสูง	7 – 23 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	4 – 7 ม.	ดอก	สีแดงแสด
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	-
ลำต้น	สีน้ำตาล	ช่วงการมีดอก	ตลอดปี มีมากเดือน ต.ค. – ก.พ. เริ่มอายุ 4 ปีขึ้นไป

ลักษณะนิสัย

ดิน	ร่วน ระบายน้ำดี	ความชื้น	ปานกลาง - ต่ำ
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	เพลี้ยอ่อน ทำให้ปลายใบหงิกงอ

อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 5 ม. ห่าง 6 – 8 ม.



การใช้งาน :

- เหมาะปลูกกลางแจ้ง เลี้ยงง่าย โตเร็ว
- ปลูกเป็นกลุ่มตามถนน
- ภาคกลางปลูกไม่งามเท่าที่ควร นิยมปลูกริมทะเล

14. งิ้ว

ชื่อสามัญ : Kapok tree, Cotton tree, Red cotton tree, Shaving brush, Silk cotton tree
ชื่อวงศ์ : BOMCABACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bombax ceiba L.

ลักษณะ

รูปทรง	-	ใบ	ใบรูปรี หรือรูปใบหมอก
ความสูง	15-20 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	-	ดอก	สีส้ม หรือสีเหลือง
ผิวสัมผัส	-	กลิ่น	หอมเอียน
ลำต้น	เปลือกสีเทามีหนาม	ช่วงการมีดอก	ม.ค.-ก.พ.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ร่วนปนทราย	ความชื้น	-
แสง	แดดจัด	โรค/แมลง	-

อัตราการเจริญเติบโต : -
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : -



การใช้งาน :

- ปลูกเป็นฉากหลังของสวนขนาดใหญ่
- น้ำมันจากเมล็ดใช้ปรุงอาหาร ทำสบู่ เปลือกให้ใยทำเชือก เกสรใช้ปรุงเป็นอาหาร ยางจากเปลือกและรากรักษาโรคบิด ดอกแก้ปวดเมื่อยทำให้นอนหลับ

15. ชงโค ; เสี้ยว

ชื่อสามัญ : Purple orchid tree, Orchid tree
ชื่อวงศ์ : LEG. - CAESALPINIOIDEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia purpurea L.; B. variegata L.

ลักษณะ

รูปทรง	กลม	ใบ	สีเขียวอ่อน
ความสูง	5 – 10 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	3 – 5 ม.	ดอก	สีชมพู – ม่วงเข้ม; ขาว
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	หอมอ่อนๆ
ลำต้น	สีน้ำตาลอ่อน	ช่วงการมีดอก	หมุนเวียนตลอดปี; ตลอดปี เริ่มมีดอกอายุ 3 – 5 ปี

ลักษณะนิสัย

ดิน	ระบายน้ำดี	ความชื้น	สูง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	ไรแดงเกาะท้องใบ โรคหรือแมลงเจาะกิ่งและโคนต้นทำให้เป็นแผล

อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 4 ม. ห่าง 6 – 8 ม.



การใช้งาน :

- ขนาดเล็กจึงนิยมปลูกในบ้านและปลูกริมทะเลได้
- ดอกมีลักษณะสวยงาม คล้ายดอกกล้วยไม้
- นิยมปลูกร่วมกับกาหลง โยทะกา เพราะมีใบคล้ายกัน

16. ตะแบกนา

ชื่อสามัญ : Queen's flower
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia floribunda Jack

ลักษณะ

รูปทรง	ไข่	ใบ	สีเขียวนวลเป็นมัน ใบอ่อนสีแดง มีขนสั้นๆ ใบแก่จะเรียบ
ความสูง	15 – 30 ม.		
ขนาดทรงพุ่ม	5 – 7 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ผิวสัมผัส	หยาบ	ดอก	สีม่วงปนชมพูแล้วเปลี่ยนเป็นขาว
ลำต้น	สีเทามัน มีรอยวงขาว ต้นแก่จะร่อนเป็นแผ่น คล้ายต้นฝรั่ง	กลิ่น	-
		ช่วงการมีดอก	ก.ค. – ก.ย. เกือบตลอดปี

ลักษณะนิสัย

ดิน	ร่วน	ความชื้น	ปานกลาง – ต่ำ ทนแล้ง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	แมลงกินใบ,หนอนผีเสื้อกลางคืน

อัตราการเจริญเติบโต : ช้า (ขึ้นกับสภาพแวดล้อม)
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 4 – 5 ม. ห่าง 6 – 8 ม.



การใช้งาน :

- นิยมปลูกตามบ้านทั่วไปและริมถนน เพราะขนาดไม่ใหญ่มากนัก และโตช้า ผลัดใบใหม่สีแดง
- ดอกสวยและช่วงการมีดอก (ฤดูร้อน) ไม่ตรงกับไม้ชนิดอื่น (ฤดูหนาว)

17. ตาเบเหลือง (เหลืองปรีดียาธร)

ชื่อสามัญ : Silver trumpet tree, Golden bell
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tabebuia argentea Britt.

ลักษณะ

รูปทรง	ไข่	ใบ	หลังใบสีเขียวเข้ม ท้องใบสีน้ำเงิน ใบประกอบแบบนิ้วมือใบย่อย 5-7 ใบ
ความสูง	8 – 10 ม.		
ขนาดทรงพุ่ม	4 – 5 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ผิวสัมผัส	หยาบ	ดอก	สีเหลือง ออกที่ปลายกิ่ง
ลำต้น	สีน้ำตาลอ่อน เปลือกแตกเป็นร่องขรุขระ	กลิ่น	-
		ช่วงการมีดอก	ก.พ. – มี.ค.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ร่วน การระบายน้ำดี	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	มีเชื้อราที่เปลือกแตก

อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 5 ม. ห่าง 6 – 8 ม.



การใช้งาน :
- ปลูกประดับในสวนสวยงามทั้งดอกและใบ
- ออกดอกสีเหลืองทองทั้งต้น
- เป็นกลุ่ม ต้นเดียว ในสนามหรือมุมอาคาร เหมาะกับสวนธรรมชาติ
- เปลือกแตกและผุตามธรรมชาติ ต้องพ่นยากันรา

18. ตีนเป็ดฝรั่ง

ชื่อสามัญ : Tecomate, Jicara, Morro
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crescentia alata HBK.

ลักษณะ

รูปทรง	แผ่กว้าง	ใบ	สีเขียวอ่อน
ความสูง	4 – 8 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	4 – 6 ม.	ดอก	สีม่วงเข้มจนถึงสีน้ำตาล ปลายออกสีเขียวอมเหลือง
ผิวสัมผัส	ละเอียด	กลิ่น	เหม็น
ลำต้น	สีน้ำตาลเข้ม	ช่วงการมีดอก	หมุนเวียนตลอดปี

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทุกชนิด	ความชื้น	สูง ทนน้ำท่วมได้บ้าง
แสง	แดดเต็มวัน - ครึ่งวัน	โรค/แมลง	-

อัตราการเจริญเติบโต : ช้า
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 4 ม. ห่าง 5 – 8 ม.



การใช้งาน :
- รูปร่างสะดุดตา ทำให้เกิดเงาสวย นิยมใช้ประดับสวนทั่วไป
- พุ่มโปร่งแสงส่องลงถึงด้านล่าง สามารถจัดสวนหย่อมใต้ต้นได้
- ปลูกริมทะเล

19. แตรชมพู

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tabebuia pallida (Lindl.) Miers

ลักษณะ

รูปทรง	แผ่	ใบ	สีเขียว
ความสูง	5 – 10 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	3 – 4 ม.	ดอก	สีชมพูอ่อน
ผิวสัมผัส	ละเอียด	กลิ่น	-
ลำต้น	สีน้ำตาลเข้ม	ช่วงการมีดอก	มี.ค. – ก.ค.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง – ต่ำ
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	-

อัตราการเจริญเติบโต : ช้า
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 4 ม. ห่าง 5 – 6 ม.



การใช้งาน :
- ทั้งต้น ใบ กิ่ง ดอก ดูนุ่มนวลมาก
- ปลูกเป็นกลุ่ม หรือต้นเดียว ในสนามหรือมุมบ้าน เหมาะสำหรับปลูกในที่ขนาดเล็ก โตช้า

20. ทองกวาว

ชื่อสามัญ : Flame of the forest Bastard teak
ชื่อวงศ์ : LEG. - PAPILIONOIDEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea monosperma (Lam.) Taub.

ลักษณะ

รูปทรง	กลม	ใบ	สีเขียวทึบ
ความสูง	5 – 15 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	6 – 8 ม.	ดอก	สีแดง ส้ม หรือเหลือง
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	-
ลำต้น	น้ำตาลอ่อน	ช่วงการมีดอก	ธ.ค. – มี.ค.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง – ต่ำ
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	แมลงปีกแข็งกินใบ

อัตราการเจริญเติบโต : ช้า
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 4 ม. ห่าง 6 – 8 ม.



การใช้งาน :
- นิยมใช้ในที่สาธารณะ หรือสวนรุกขชาติ
- ต้นแข็งแรง เติบโตได้ดี เลี้ยงดูง่าย ดอกสวย
- ทนแล้ง ทนเค็ม ทนอากาศหนาว เป็นไม้พื้นเมืองของไทย
- ในกทม. จะมีดอกน้อยกว่าภาคเหนือแต่ต้นแข็งแรงดี
- ปลูกริมถนนในที่ดินแห้งแล้งทั่วไป และปลูกกริมทะเล



21. ทองหลางด่าง

ชื่อสามัญ : Tiger claw , Variegated coral tree
ชื่อวงศ์ : LEG. - PAPILIONOIDEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythrina variegata L.

ลักษณะ

รูปทรง	กลม	ใบ	สีเขียว เส้นลายใบสีเหลือง ทิ้งใบหมดเมื่อต้นมีดอก
ความสูง	10 – 25 ม.		
ขนาดทรงพุ่ม	10 – 12 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ผิวสัมผัส	หยาบ	ดอก	สีแดงเพลิง ขาว
ลำต้น	สีขาว มีเส้นร่องห่างๆ ตามยาว มีหนามเล็กๆ กระจายรอบลำต้น	กลิ่น	หอมอ่อนๆ
		ช่วงการมีดอก	ม.ค. – ก.พ

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง – ต่ำ
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	เมื่อต้นเล็กจะมีเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยเกาะที่ใบและลำต้นมาก
อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว			

ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 4 – 5 ม. ห่าง 8 – 12 ม.

การใช้งาน :
- ใบด่างเหลือง ดอกสีแดงสวยเด่นสะดุดตา เหมาะปลูกริมถนน
- สามารถใช้ในที่สาธารณะได้ เพราะใบใหญ่เก็บกวาดง่าย
- มีหนามที่ลำต้นและกิ่ง ปลูกริมทะเลได้
- แข็งแรง ฟื้นต้นเร็วหลังการขุดล้อม

22. ไทรด่าง

ชื่อสามัญ : Variegated mini – rubber
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus benjamina L. var. variegata

ลักษณะ

รูปทรง	แผ่	ใบ	สีขาวหรือครีม มีสีกลางใบ
ความสูง	10 – 15 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	มากกว่า 10 ม.	ดอก	สีครีม
ผิวสัมผัส	ละเอียด	กลิ่น	-
ลำต้น	สีน้ำตาล	ช่วงการมีดอก	ธ.ค. – ก. พ.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง – สูง
แสง	แดดเต็มวัน - ร่ม	โรค/แมลง	หนอนกินใบ เพลี้ยไฟ
อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง			

ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 2 – 3 ม. 35/ม.^{2}(6") ห่าง 4 - 6 ม. 25/ม.^{2}(6")

การใช้งาน :
- นิยมปลูกในที่ร่ม ปลูกริมทะเล ทนลมได้
- เหมาะปลูกให้ร่มเงาในสวนสาธารณะ โดยเฉพาะในที่แสงน้อยจะทำให้สว่างขึ้น
- พุ่มใบทึบให้ปลูกหญ้าใต้ต้นไม่ได้
- ใช้ต้นเล็กปลูกเป็นแปลงในสวนหรือตัดแต่งทรงพุ่ม





23. ไทรย้อยใบแหลม

ชื่อสามัญ : Weeping fig
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus benjamina L.

ลักษณะ

รูปทรง	แผ่กว้าง ห้อยย้อย	ใบ	สีเขียวอ่อนเมื่ออ่อนอยู่ เข้มขึ้นเมื่อแก่ ใบหนาแน่น
ความสูง	10 – 30 ม.		
ขนาดทรงพุ่ม	มากกว่า 10 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ผิวสัมผัส	ละเอียด	ดอก	สีครีม
ลำต้น	สีน้ำตาล	กลิ่น	-
		ช่วงการมีดอก	ธ.ค. – ก.พ.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง – สูง
แสง	แดดเต็มวัน - ร่ม	โรค/แมลง	หนอนกินใบ เพลี้ยไฟ
อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว			

ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 4 – 5 ม. ห่าง 8 – 10 ม.

การใช้งาน :
- นิยมปลูกริมน้ำหรือที่มีน้ำขัง ใบร่วงมากในที่แล้ง ปลูกริมทะเลได้
- รูปทรงและรากอากาศห้อยลงสวยงาม เหมาะปลูกให้ร่มเงาในสวนสาธารณะ
- ทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ทนลม ใช้เป็นไม้กระถางภายในได้ดี
- ระบบรากชอนไชได้ไกล อาจทำลายอาคาร ถ้าควบคุมทรงพุ่มระบบรากจะไม่ขยายเกินแนวขนาดพุ่ม
- พุ่มใบให้ร่มเงาทึบทำให้หญ้าใต้ต้นตาย อาจปูพื้นแข็งเป็นที่นั่งเล่น

24. ไทรอิเรกูล่า

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus celebensis Corner

ลักษณะ

รูปทรง	ห้อยย้อย	ใบ	สีเขียวสดแคบเรียวแหลม ก้านใบสีแดง
ความสูง	8 – 12 ม.		
ขนาดทรงพุ่ม	6 – 8 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ผิวสัมผัส	ละเอียด	ดอก	สีครีม
ลำต้น	สีน้ำตาล	กลิ่น	-
		ช่วงการมีดอก	พ.ค. – ก.พ.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี	ความชื้น	ปานกลาง ความชื้นสม่ำเสมอ
		โรค/แมลง	เพลี้ยไฟ
แสง	แดดเต็มวันพอปรับตัวในที่ร่มรำไรได้		
อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง			

ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 4 ม. ห่าง 5 – 6 ม.

การใช้งาน :
- แตกกิ่งก้านใบห้อยย้อยดูคล้ายหลิว รูปทรงสวยงามมาก
- รูปทรงเหมาะสำหรับปลูกบริเวณริมน้ำ แต่ไม่ทนน้ำท่วมขัง
- ทิ้งใบมากในที่ร่มเกินไป
- ขยายพันธุ์ยาก วิธีที่ดีที่สุด คือปักชำ



25. นนทรี

ชื่อสามัญ : Copper pod, Yellow flame, Yellow poinciana
ชื่อวงศ์ : LEG. - CAESALPINIOIDEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peltophorum ptercarpum (DC.) Backer ex K. Heyne

ลักษณะ

รูปทรง	กลม	ใบ	สีเขียวสด
ความสูง	8 – 20 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	5 – 10 ม.	ดอก	สีเหลือง
ผิวสัมผัส	ละเอียด	กลิ่น	หอม
ลำต้น	สีน้ำตาลปนเทาเรียบ แตกสะเก็ดบ้าง	ช่วงการมีดอก	ก.พ. – มี. ค.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	หนอนชอนกิ่ง ทำให้กิ่งเปราะหักง่าย

อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 4 – 5 ม. ห่าง 8 – 10 ม.



การใช้งาน :

- ต้องค้ำยันขณะต้นยังเล็กอยู่ เพราะลำต้นยังไม่แข็งแรง รอจนลำต้นโต Ø6"- 8" ก่อน
- นิยมปลูกเป็นกลุ่มในสนามกว้าง ริมถนน ทางเดิน ที่จอดรถตามสวนสาธารณะ รีสอร์ทริมทะเล เพราะแข็งแรงและโตเร็ว

26. ประดู่แดง

ชื่อสามัญ : Fire of Pakistan , Monkey flower tree
ชื่อวงศ์ : LEG. - CAESALPINIOIDEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllocarpus septrentrionalis Donn. Sm.

ลักษณะ

รูปทรง	แผ่กว้าง ห้อยย้อย	ใบ	สีเขียว
ความสูง	10 – 30 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	5 – 6 ม.	ดอก	สีแดงส้ม
ผิวสัมผัส	ละเอียด	กลิ่น	-
ลำต้น	สีน้ำตาลอ่อนกระน้ำตาลเข้ม	ช่วงการมีดอก	ม.ค. – ก.พ.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ร่วน ระบายน้ำดี	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	-

อัตราการเจริญเติบโต : ช้า
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 4 ม. ห่าง 5 – 6 ม.



การใช้งาน :

- มีดอกหลังจากผลัดใบ ดอกสีแดงสวยงามมาก ออกตามกิ่งบานนาน 1 – 2 อาทิตย์ ควรปลูกในตำแหน่งที่เป็นจุดเด่น
- กิ่งก้านห้อยย้อยคล้ายหลิว มองดูอ่อนหวาน
- หาต้นขนาดใหญ่ได้ยาก เพราะโตช้า

27. ปาล์มหางหมาจิ้งจอก

ชื่อสามัญ : Foxtail palm
ชื่อวงศ์ : PALMAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wodyetia bifurcata A.K. Irvine

ลักษณะ

รูปทรง	ปาล์ม	ใบ	สีเขียว ใบประกอบแคบมาก เรียงเป็นฟูกลม
ความสูง	10 – 15 ม.		
ขนาดทรงพุ่ม	2.5 – 3 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ผิวสัมผัส	หยาบ	ดอก	สีขาว
ลำต้น	สีน้ำตาล ผิวเรียบเห็นข้อ	กลิ่น	-
		ช่วงการมีดอก	เกือบตลอดปี

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป ดินร่วน	ความชื้น	ปานกลาง - สูง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	ด้วงงวงกินยอดอ่อน

อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 2 – 3 ม. ห่าง 4 – 5 ม.



การใช้งาน :

- ใบเป็นช่อสวยงาม ควรปลูกเป็นแนว 2 ข้างทางเดินหรือปลูกเป็นกลุ่ม 3 – 5 ต้น
- ปลูกริมทะเล ต้นเล็กใช้ประดับอาคารได้

28. ปีบ

ชื่อสามัญ : Indian cork tree
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millingtonia hortensis L.f.

ลักษณะ

รูปทรง	ไข่	ใบ	สีเขียว
ความสูง	5 – 25 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	6 – 8 ม.	ดอก	สีขาว รูปแตร
ผิวสัมผัส	ละเอียด	กลิ่น	หอมตอนเย็น - กลางคืน
ลำต้น	สีน้ำตาลแตกเป็นร่องลึก	ช่วงการมีดอก	ก.พ. – พ.ย. บานเวลาเย็น

ลักษณะนิสัย

ดิน	ร่วน ระบายน้ำดี	ความชื้น	ปานกลาง - สูง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	-

อัตราการเจริญเติบโต : ค่อนข้างเร็ว
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 4 ม. ห่าง 5 – 8 ม.



การใช้งาน :

- ปลูกประดับสวน ริมถนน เป็นที่นิยมมากเพราะพุ่มใบสวย ดอกหอม
- เลี้ยงง่ายและหาซื้อได้ทุกขนาด
- ใบและดอกร่วงทุกวัน ต้องหมั่นเก็บกวาด

29. แปรงล้างขวด

ชื่อสามัญ : Weeping bottle brush
ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G. Don ex Loud

ลักษณะ

รูปทรง	ห้อยย้อย	ใบ	สีเขียวอ่อน
ความสูง	10 – 18 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	4 – 5 ม.	ดอก	กลีบดอกสีขาว ก้านเกสรตัวผู้ สีแดงสดหรือสีชมพู
ผิวสัมผัส	ละเอียด		
ลำต้น	สีน้ำตาล แตกเป็นร่อง	กลิ่น	-
		ช่วงการมีดอก	หมุนเวียนตลอดปี

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทุกชนิด	ความชื้น	ปานกลาง - สูง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	หนอนเจาะลำต้นด้วงหนวดยาว
อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง			

ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 4 – 5 ม. ห่าง 6 – 8 ม.



การใช้งาน :

- ลักษณะคล้ายหลิว แต่ใบหยาบกว่าและพุ่มแน่นทึบกว่า มองดูไม่นุ่มนวลเท่าหลิว
- ตัดแต่งได้ นิยมปลูกริมถนน
- ดอกเด่นสะดุดตา มีมากเดือน มี.ค. – ต.ค.
- ถ้าปลูกในที่แห้งแล้ง ทรงพุ่มใบจะดูแห้งกว่าปลูกใกล้น้ำ
- ทนแล้งและน้ำท่วมขังแฉะ

30. พญาสัตบรรณ

ชื่อสามัญ : Devil tree. White cheesewood
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia scholaris (L.) R. Br.

ลักษณะ

รูปทรง	แผ่เป็นชั้น	ใบ	ใบเดี่ยวรูปใบหอก ออกตามข้อเรียงกันเป็นฉัตร 3-7 ใบ
ความสูง	15 – 30 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	5 – 7 ม.	ดอก	สีขาว ขาวอมเหลือง
ผิวสัมผัส	หยาบ		
ลำต้น	สีน้ำตาลอ่อนปนเทา มีน้ำยางมาก	กลิ่น	ฉุน
		ช่วงการมีดอก	ต.ค. – พ.ย.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป ดินปนทราย	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดปานกลาง - แดดจัด	โรค/แมลง	แมลงเจาะใบเพื่อวางไข่ ทำให้ใบเป็นปุ่ม ควรตัดใบทิ้ง
อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว			

ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 4 – 5 ม. ห่าง 6 – 8 ม.



การใช้งาน :

- นิยมปลูกประดับสวนเพราะแข็งแรง โตเร็ว พุ่มใบสวย และสามารถหาต้นขนาดใหญ่ได้ง่าย
- ไม่ควรปลูกในบ้านเพราะมีขนาดใหญ่มาก
- สามารถตัดแต่งพุ่มให้เตี้ยแต่สวยงามได้ เมื่ออยู่ใต้สายไฟ

31. พิกุล

ชื่อสามัญ : Bullet wood, Tanjong tree, Mimusops
ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mimusops elengi L.

ลักษณะ

รูปทรง	กลม	ใบ	สีเขียวเข้มเป็นมัน
ความสูง	5 – 18 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	4 – 8 ม.	ดอก	สีขาว
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	หอม
ลำต้น	สีน้ำตาล	ช่วงการมีดอก	หมุนเวียนตลอดปี

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	-
อัตราการเจริญเติบโต : ช้า			

ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 4 ม. ห่าง 5 – 6 ม.



การใช้งาน :

- ใช้เป็นไม้กระถางประดับในอาคารได้
- ปลูกริมถนนได้ดีเพราะทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ แต่ไม่ผลัดใบโตช้า ทำให้ไม่ต้องตัดแต่งบ่อย
- สามารถตัดแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ ได้
- รูปทรงปิรามิด ขณะที่ต้นยังเล็กอยู่
- ทรงพุ่มทึบมากทำให้หญ้าตาย

32. มะขาม

ชื่อสามัญ : Tamarind, Indian date
ชื่อวงศ์ : LEG. - CAESALPINIOIDEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tamarindus indica L.

ลักษณะ

รูปทรง	กลม	ใบ	สีเขียวหม่น
ความสูง	5 – 25 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	5 – 20 ม.	ดอก	เหลืองอมส้ม มีจุดประสีแดง
ผิวสัมผัส	ละเอียด	กลิ่น	-
ลำต้น	สีเทาแกมน้ำตาลเข้ม	ช่วงการมีดอก	มี.ค. – พ.ค.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	แมลงและหนอนกินดอกและใบอ่อน
อัตราการเจริญเติบโต : ช้า			

ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 4 ม. ห่าง 6 – 8 ม.

การใช้งาน :

- เจริญในดินทราย และปลูกริมทะเลได้
- ใช้ประดับตามถนนดีมาก ลำต้นสีเข้มตัดกับใบสีอ่อน ทนทาน เลี้ยงดูง่าย ทนน้ำขังแฉะ
- ระวังใบร่วงมากและมีขนาดเล็ก ปลิวไปอุดตันท่อระบายน้ำได้





33. มะรุม

ชื่อสามัญ : Horse radish tree
ชื่อวงศ์ : Moringaceae
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Moringa oleifera Lam.

ลักษณะ

รูปทรง	-	ใบ	เป็นไม้ใบรวม ออกรวมกัน เป็นแผงๆ ละ 5-9 ใบ สีเขียว
ความสูง	15 - 20 ม.	ดอก	ดอกมีสีเหลืองนวล มีอยู่ 5 กลีบ เกสรกลางดอกเป็นสีเหลืองเข้ม
ขนาดทรงพุ่ม	-	กลิ่น	-
ผิวสัมผัส	ผิวค่อนข้างเรียบ	ช่วงการมีดอก	-
ลำต้น	สีเทาอ่อน		

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทุกชนิด	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	ชอบแสงแดดจัด	โรค/แมลง	-

อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : -

การใช้งาน :

- เมล็ดคั้นได้น้ำมันคุณภาพสูงใช้เป็นอาหารและใช้ถนอมผิว กากที่เหลือใช้แทนสารส้มในการทำให้น้ำใสและสะอาด
- ใบและกิ่ง เป็นอาหารสัตว์
- ทั้งต้น เป็นพืชบำรุงดิน ใช้พื้นฟูสภาพดิน ใช้เป็นพืชบังลม รั้วไม้เป็น (รั้วกินได้)

34. มะฮอกกานีใบเล็ก

ชื่อสามัญ : Dominican mahogany
ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Swietenia mahogani (L.) Jacq.

ลักษณะ

รูปทรง	ไข่	ใบ	หลังใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ท้องใบสีเขียวอ่อนกว่า เส้นกลางใบสีน้ำตาลแดง
ความสูง	15 – 18 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	5 – 6 ม.	ดอก	สีเหลืองอมเขียว
ผิวสัมผัส	ละเอียด	กลิ่น	หอม
ลำต้น	สีน้ำตาลเข้มปนดำ	ช่วงการมีดอก	พ.ค. – มิ.ย. หลังผลิใบ

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	-

อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 4 ม. ห่าง 6 – 8 ม.

การใช้งาน :

- กิ่งก้านแผ่มากกว่ามะฮอกกานีใบใหญ่
- นิยมปลูกให้ร่มเงาแก่ลานจอดรถ ริมถนน แต่โตช้า ปลูกริมทะเลได้
- เลี้ยงดูง่าย ใบไม่ร่วงมาก แต่หาได้ยากกว่ามะฮอกกานีใบใหญ่





35. มะฮอกกานีใบใหญ่

ชื่อสามัญ : Bay wood, Honduras mahogany
ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Swietenia macrophylla King

ลักษณะ

รูปทรง	กระบอก	ใบ	ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวอ่อนกว่า ใบยาว 10 – 15 ซม. กว้าง 4 – 5 ซม.
ความสูง	15 – 20 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	4 – 6 ม.	ดอก	สีเหลืองอมเขียว
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	หอม
ลำต้น	สีน้ำตาลเข้มปนดำ	ช่วงการมีดอก	พ.ค. – มิ.ย.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ร่วน	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	หนอนกัดกินใบเล็กน้อย

อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 4 – 5 ม. ห่าง 6 – 8 ม.

การใช้งาน :

- ปลูกให้ร่มเงาบริเวณลานจอดรถ ริมถนน โตเร็วใบไม่ร่วงมาก เลี้ยงดูง่าย
- รูปทรงผอมชะลูดจะมีกิ่งก้านแผ่ออกเมื่อปลูกได้หลายปี
- ใช้ทำซุงในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำอเมซอน
- ปลูกริมทะเลได้ พบทั่วไปใน กทม.

36. รัตมา

ชื่อสามัญ : Rattama, Jerusalem thorn
ชื่อวงศ์ : LEG. - CAESALPINIOIDEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parkinsonia aculeata L.

ลักษณะ

รูปทรง	ห้อยย้อย	ใบ	สีเขียวเข้ม
ความสูง	4 – 10 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	5 - 6 ม	ดอก	สีเหลือง
ผิวสัมผัส	ละเอียด	กลิ่น	หอม
ลำต้น	สีน้ำตาลอ่อนปนเขียว	ช่วงการมีดอก	ส.ค. – ก.ย.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ร่วนปนทราย ระบายน้ำดี	ความชื้น	ต่ำ
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	-

อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 2 – 3 ม. ห่าง 5 – 6 ม.

การใช้งาน :

- รูปทรงสวยงาม โปร่งไม่รก เป็นไม้ประดับสวนอย่างดี
- ที่มองเห็นเป็นเส้นลู่ลงคือก้านใบ จะมีใบเล็กๆ อยู่ด้วย
- ทนน้ำขังและทนแล้งได้ดี ปลูกบนเกาะกลางถนนได้
- ไม่ควรปลูกในสนามเด็กเล่นเพราะมีหนาม
- เหมาะปลูกริมน้ำ มุมบ้านหรือสวนย่อม เช่นเดียวกับต้นหนวดปลาหมึกและตีนเป็ดฝรั่ง เพราะแสงผ่านลงพื้นล่างได้





37. ราชพฤกษ์ (คูน)

ชื่อสามัญ : Golden shower, Indian laburnum , Pudding pipe tree
ชื่อวงศ์ : LEG. - CAESALPINIOIDEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia fistula L.

ลักษณะ

รูปทรง	กลม	ใบ	สีเขียวอ่อน ทิ้งใบก่อนออกดอก
ความสูง	10 – 20 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	4 - 6 ม.	ดอก	สีเหลืองสด
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	-
ลำต้น	สีเทาอ่อนเรียบเกลี้ยง ต้นแก่เป็นสีน้ำตาลเข้ม	ช่วงการมีดอก	ก.พ. – พ.ค.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป ทนดินเลว	ความชื้น	น้อย - ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	แมลงเจาะไชกิ่งและลำต้น มีโอกาสตายมากกว่าไม้อื่น
อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง			
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 4 – 5 ม. ห่าง 6 – 8 ม.			

การใช้งาน :

- ไม่ควรปลูกจำนวนมากในที่เดียว เพราะถ้ามีแมลงเข้าทำลายอาจตายทั้งกลุ่ม
- ไม่ควรปลูกในที่มีระดับน้ำใต้ดินสูงเพราะรากจะเน่าได้ ควรปลูกสูงจากระดับดินเดิมและระวังอย่าให้ตุ้มดินแตกเมื่อกำลังปลูก
- เป็นไม้ประจำชาติไทย สัญลักษณ์ทางศาสนา เป็นไม้มงคล
- ปลูกริมทะเลได้
- นิยมปลูกตกแต่งริมถนนและในสวน เพราะดอกสีสวยสดใสมาก

38. ลั่นทม (ลีลาวดี)

ชื่อสามัญ : Temple tree, Pagoda tree
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria spp.

ลักษณะ

รูปทรง	แผ่กว้าง	ใบ	หลังใบสีเขียวเข้ม ท้องใบสีเขียวนวล
ความสูง	6 – 8 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	6 - 8 ม.	ดอก	สีขาว เหลือง แดง ส้ม
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	หอม
ลำต้น	สีน้ำตาล มียางขาว	ช่วงการมีดอก	เกือบตลอดปี

ลักษณะนิสัย

ดิน	ร่วน ดินปนทราย ระบายน้ำดี	ความชื้น	ปานกลาง - สูง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	เพลี้ยแป้ง
อัตราการเจริญเติบโต : ช้า			
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 2 – 4 ม. ห่าง 5 – 6 ม.			

การใช้งาน :

- ทรงพุ่มแผ่สวยงาม ดอกหอม ควรปลูกในพื้นที่กว้างรับแสงเต็มที่
- ในอดีตนิยมปลูกในสวนสาธารณะหรือวัด เพราะถือว่าชื่อไม่เป็นมงคล ปัจจุบันนิยมใช้ในงานจัดสวนมาก มีราคาสูง
- ผลัดใบฤดูร้อน ยกเว้นพันธุ์ขาวพวง ปลูกริมทะเลได้
- ลั่นทมแคระปลูกในกระถางได้สวย เพราะมีดอกบ่อย





39. ลั่นทมใบลูกศร

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria pudica Jacq.

ลักษณะ

รูปทรง	ไข่	ใบ	สีเขียวเป็นมันรูปลูกศร
ความสูง	3-4 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	3-4 ม.	ดอก	สีขาว
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	-
ลำต้น	น้ำตาลอ่อน	ช่วงการมีดอก	หมุนเวียนตลอดปี

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	เพลี้ยแป้ง
อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว			
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 2-3 ม. ห่าง 5-6 ม.			

การใช้งาน :

- พุ่มใบมันและมีรูปทรงสะดุดตา
- แตกพุ่มต่ำ มีดอกตลอดปีแต่ดอกไม่หอม
- เจริญเติบโตเร็วกว่าลั่นทมชนิดอื่นๆ
- กิ่งก้านอ่อนควรค้ำยันทรงพุ่มเมื่อปลูกใหม่

40. ลำดวน

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum fruticosum Lour.

ลักษณะ

รูปทรง	ไข่	ใบ	หลังใบสีเขียวเข้ม ท้องใบนวล
ความสูง	5 – 15 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	4 - 6 ม.	ดอก	สีเหลืองนวล
ผิวสัมผัส	ละเอียด	กลิ่น	หอมเย็น เวลาเย็น - เช้า
ลำต้น	ผิวแตกขรุขระเป็นสะเก็ด	ช่วงการมีดอก	มี.ค. - เม.ย.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ร่วนซุย	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน - ครึ่งวัน	โรค/แมลง	หนอนเจาะลำต้น
อัตราการเจริญเติบโต : ช้า			
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 5 ม. ห่าง 6 – 8 ม			

การใช้งาน :

- ควรปลูกในที่มีความชุ่มชื้นหรืออยู่ใต้ร่มเงาของไม้อื่น จึงจะเจริญได้ดีใน กทม.
- อายุหลายปีจึงให้ดอก ดอกหอม ผลกินได้
- ไม่ควรใช้ต้นที่ขุดล้อมมาเพราะต้องใช้เวลาพักฟื้นนานเกือบปี ถ้าปลูกลงดินเลย โอกาสตายสูงเช่นเดียวกับต้นแก้วใหญ่ๆ ที่ล้อมมาปลูก





41. ศรีตรัง

ชื่อสามัญ : Jacaranda
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jacaranda obtusifolia Humb. & Bonpl. ssp. rhombifolia (G.Mey) A.Gentry

ลักษณะ

รูปทรง	ไข่	ใบ	สีเขียวอ่อน ทิ้งใบก่อนออกดอก
ความสูง	4 – 10 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	4 - 5 ม.	ดอก	สีม่วง
ผิวสัมผัส	ละเอียด	กลิ่น	-
ลำต้น	สีเทาปนน้ำตาลอ่อน	ช่วงการมีดอก	ม.ค. - มี.ค. เริ่มออกดอกเมื่ออายุ 4 – 6 ปี

ลักษณะนิสัย

ดิน	อินทรีวัตถุระบายน้ำได้ดี	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	-

อัตราการเจริญเติบโต : ช้า
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 4 ม. ห่าง 5 – 8 ม.

การใช้งาน :
- ปลูกเป็นกลุ่มประดับสนาม ให้ดอกสวยงาม
- ขึ้นในที่แห้งแล้งจะทิ้งใบหมดต้น ชอบอากาศหนาวเย็น ปลูกใน กทม. ไม่ค่อยได้ผลเพราะเจริญเติบโตช้ามาก

42. สนดินสอ

ชื่อสามัญ : Italian Cypress
ชื่อวงศ์ : CUPRESSACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cupressus sempervirens L. var. stricta

ลักษณะ

รูปทรง	-	ใบ	สีเขียวเข้ม ขนาดเล็ก
ความสูง	4.0 – 15.0 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	1.0 – 5.0 ม.	ดอก	-
ผิวสัมผัส	-	กลิ่น	-
ลำต้น	ลำต้นตรง	ช่วงการมีดอก	-

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	-
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	-

อัตราการเจริญเติบโต : ช้า
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1.0 – 2.0 ม. ห่าง 1.0 – 2.0 ม.

การใช้งาน :
- นิยมแต่ง formal garden โตช้า ชอบดินทั่วไป ชอบแดดเช้าและแดดเต็มวัน ถ้าอากาศเย็นจะโตเร็ว และแตกพุ่มใหญ่ ควรปลูกเป็นกลุ่ม 2 – 3 ต้น





43. สนมังกร

ชื่อสามัญ : Chinese juniper
ชื่อวงศ์ : CUPRESSACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Juniperus chinensis L.

ลักษณะ

รูปทรง	ปิรามิด	ใบ	สีเขียวเข้ม
ความสูง	3 – 20 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	1 - 5 ม.	ดอก	-
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	-
ลำต้น	สีน้ำตาลเข้ม	ช่วงการมีดอก	-

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเช้าหรือเต็มวัน	โรค/แมลง	เชื้อรา

อัตราการเจริญเติบโต : ช้า
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1 – 1.5 ม. ห่าง 2 – 3 ม.

การใช้งาน :
- เป็นประธานสวนหย่อมในกลุ่มสวนสนได้ดี ควรปลูกเป็นกลุ่ม 3 ต้น
- ดูแลรักษาง่าย พบใบแห้งด้านในทรงพุ่มบ้าง
- ควรรดน้ำที่โคนต้น ถ้ารดที่พุ่มต้นใบจะแยกไม่สวย
- ทางภาคเหนือจะพบต้นขนาดใหญ่

44. สะเดาบ้าน

ชื่อสามัญ : Siamese neem tree
ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton

ลักษณะ

รูปทรง	กลม	ใบ	สีเขียวเข้ม
ความสูง	8 – 15 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	3 - 5 ม.	ดอก	สีครีม
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	-
ลำต้น	สีน้ำตาล แตกเป็นร่องลึก	ช่วงการมีดอก	เม.ย. – พ.ค.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ต่ำ
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	-

อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 4 – 5 ม. ห่าง 6 – 8 ม.

การใช้งาน :
- ปลูกในที่มีการดูแลต่ำ ปลูกริมทะเลได้
- ให้ร่มเงาได้ดี กินใบและดอกอ่อนได้
- สกัดทำสารกำจัดแมลงได้
- มีอีกชนิดหนึ่งคือ สะเดาอินเดีย เปลือกจะเรียบและใบแคบกว่า





45. สาเก

ชื่อสามัญ : Breadfruit tree, Bread nut tree
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg (Seedless form)

ลักษณะ

รูปทรง	แผ่กว้าง	ใบ	สีเขียวเข้มเป็นมัน ขนาดใบใหญ่
ความสูง	5 – 18 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	8 - 9 ม.	ดอก	สีเหลือง
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	-
ลำต้น	สีน้ำตาล	ช่วงการมีดอก	ตลอดปี

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	หนอนเจาะลำต้นและกิ่ง

อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 5 – 6 ม. ห่าง 8 – 10 ม.

การใช้งาน :
- ปลูกรับประทานผล แต่ไม่เหมาะในสนามเด็กเล่น
- พุ่มใบสวยงาม ปลูกประดับสวนได้ดีกว่าไม้ผลชนิดอื่นๆ ใบใหญ่เก็บกวาดง่าย
- ควรตัดแต่งทรงพุ่มบ่อยๆ ขนาดจึงไม่ใหญ่และกิ่งไม่เกะกะ

46. สารภี

ชื่อสามัญ : Sarapee
ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mammea siamensis Kosterm.

ลักษณะ

รูปทรง	ไข่	ใบ	สีเขียวเข้มเป็นมัน
ความสูง	10 – 15 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	5 - 7 ม.	ดอก	สีขาว
ผิวสัมผัส	หยาบ		ก่อนโรยเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
ลำต้น	สีเทาปนดำ แตกร่องเป็นสะเก็ด	กลิ่น	หอมแรง
		ช่วงการมีดอก	ม.ค. – มี.ค.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทุกชนิด	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน – ร่มรำไร	โรค/แมลง	-

อัตราการเจริญเติบโต : ช้า - ปานกลาง
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 4 ม. ห่าง 5 – 6 ม.

การใช้งาน :
- เป็นไม้ไทย พุ่มใบสีเขียวปนเทา ดอกสวยและมีกลิ่นหอมมาก
- ใช้เป็นกลุ่มหรือเป็นฉากหลัง
- ไม้ริมทะเล
- ปลูกใหม่ใน กทม. ควรอยู่ในที่ได้รับแสงแดดเช้าหรืออยู่ใกล้ไม้ใหญ่อื่นๆ เมื่อปลูกนานแล้วจะรับแสงแดดได้ทั้งวัน





47. สุพรรณิการ์ (ฟ้ายคำ)

ชื่อสามัญ : Yellow cotton tree
ชื่อวงศ์ : COCHLOSPERMACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cochlospermum religiosum (L.) Alston;
C. regium (Mart. & Schrank) Pilg

ลักษณะ

รูปทรง	กลม	ใบ	สีเขียวสด
ความสูง	7 – 15 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	4 - 6 ม.	ดอก	สีเหลือง มีทั้งดอกลา; ดอกซ้อน
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	-
ลำต้น	สีน้ำตาล	ช่วงการมีดอก	ธ.ค. – มี.ค.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง - ต่ำ
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	เพลี้ยแป้ง ราดำ ราสนิม

อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 4 ม. ห่าง 5 – 8 ม.

การใช้งาน :
- ทิ้งใบหมดต้นเวลาออกดอก ทำให้ดอกดูเด่นมาก ใช้ต้นเดี่ยวปลูกมุมสนาม อยู่ในตำแหน่งที่ไม่หวังร่มเงา
- เพลี้ยแป้งชอบเกาะพุ่มใบ ไม้ริมทะเล

48. เสลาใบใหญ่ (อินทรชิต)

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.

ลักษณะ

รูปทรง	ไข่ กิ่งใบห้อยลง	ใบ	สีเขียว มีขนทั้ง 2 ด้าน
ความสูง	10 – 20 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	5 - 6 ม.	ดอก	สีขาว ม่วง ม่วงอมชมพู
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	-
ลำต้น	สีเทาเข้มเกือบดำ เปลือกผิวขรุขระ แตกเป็นร่องตามยาว	ช่วงการมีดอก	ออกมาก ธ.ค. – มี.ค. เกือบตลอดปี

ลักษณะนิสัย

ดิน	ร่วนซุย	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	หนอนเจาะเปลือกลำต้น

อัตราการเจริญเติบโต : ช้า - ปานกลาง
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 4 – 5 ม. ห่าง 6 – 8 ม.

การใช้งาน :
- ต้นไม้ใหญ่มาก ดอกสีสวย ปลูกให้ร่มเงาในบ้าน
- นิยมปลูกริมถนน ผลัดใบเดือน พ.ย. – ม.ค.
- เปลือกแตกเป็นร่องตามยาว พุ่มใบห้อยย้อยลง ใบมีขน



49. โสกน้ำ

ชื่อสามัญ : Asoka tree, Saraca
ชื่อวงศ์ : LEG. - CAESALPINIOIDEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saraca indica L.



ลักษณะ

รูปทรง	แผ่กว้าง ห้อยย้อย	ใบ	สีเขียว ใบอ่อนสีเขียวอ่อนสวยงาม
ความสูง	5 – 20 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	5 - 15 ม.	ดอก	สีแดง คล้ายดอกเข็ม
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	หอม
ลำต้น	สีดำ	ช่วงการมีดอก	ม.ค. – ก.พ.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	สูง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	-

อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 4 – 5 ม. ห่าง 6 – 8 ม.

การใช้งาน :

- ชอบขึ้นริมน้ำ เลี้ยงง่ายกว่าโสกพวง ใบอ่อนห้อยย้อยลงสวยงาม
- มีดอกที่ปลายกิ่งมองเห็นชัดเจน เกสรเพศผู้ 6 – 8 อัน

50. โสกเหลือง (ศรียะลา)

ชื่อสามัญ : Yellow saraca
ชื่อวงศ์ : LEG. - CAESALPINIOIDEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saraca thaipingensis Cantley ex Prain

ลักษณะ

รูปทรง	กลม	ใบ	สีเขียว
ความสูง	10 - 15 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	3 - 5 ม.	ดอก	สีเหลือง
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	-
ลำต้น	สีน้ำตาลเข้ม	ช่วงการมีดอก	ม.ค. - เม.ย.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง - มาก
แสง	แดดเต็มวัน - รำไร	โรค/แมลง	-

อัตราการเจริญเติบโต : ช้า
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 4 - 5 ม. ห่าง 6 - 8 ม.

การใช้งาน :

- ดอกสวยงามมาก ใช้เป็นจุดเด่นได้แต่ใบลู่ลงดูแห้งแล้ง
- มีดอกตามลำต้น เหมาะที่จะปลูกใกล้ลานนั่งเล่น
- ควรปลูกในกลุ่มไม้ใหญ่อื่นๆ ชอบความชื้นสูง





51. หมากเยอรมัน (หมากนวล ; หมากมนิลา)

ชื่อสามัญ : Manila palm, Christmas palm
ชื่อวงศ์ : PALMAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adonidia merrillii (Becc.)

ลักษณะ

รูปทรง	ปาล์ม	ใบ	สีเขียวอ่อน กาบใบสีขาวนวล
ความสูง	4 - 6 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	1.5 - 2.5 ม.	ดอก	สีครีม
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	-
ลำต้น	สีน้ำตาลอ่อน เห็นข้อชัดเจน	ช่วงการมีดอก	เมื่อต้นสมบูรณ์

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	ด้วงงวงกินยอดอ่อน

อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1.5 - 2 ม.ห่าง 3 - 4 ม.

การใช้งาน :

- ใช้ปลูกเป็นแถว 2 ข้างทางเดินในสวนแบบประดิษฐ์ ปลูกเป็นกลุ่มหลายต้นจะสวยกว่าปลูกต้นเดียว
- ไม้ริมทะเล

52. หลิว

ชื่อสามัญ : Weeping willow, Napoleon's willow
ชื่อวงศ์ : SALICACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salix babylonica L.

ลักษณะ

รูปทรง	ห้อยย้อย	ใบ	สีเขียวอ่อน
ความสูง	10 – 15 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	4 – 5 ม.	ดอก	สีขาว
ผิวสัมผัส	ละเอียด	กลิ่น	-
ลำต้น	สีน้ำตาล แตกเป็นร่อง	ช่วงการมีดอก	-

ลักษณะนิสัย

ดิน	ร่วน - เหนียว	ความชื้น	สูง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	หนอนเจาะกิ่งและลำต้น

อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 4 – 5 ม. ห่าง 6 – 8 ม.

การใช้งาน :

- เหมาะปลูกริมน้ำเพราะรูปทรงอ่อนช้อย พลิ้วไปกับน้ำ อีกทั้งมีเงาสะท้อนที่สวยงามด้วย เจริญเติบโตเร็ว
- รูปทรงและพุ่มใบช่วยลดความกระด้างของอาคารได้
- หาต้นขนาดใหญ่ได้ยาก อาจใช้ไทรอิเรกูล่าหรือแปรงล้างขวด ซึ่งมีรูปทรงคล้ายกันแทน





53. หลิวทอง

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melaleuca bracteata F. Muell. 'Revolution Gold'

ลักษณะ

รูปทรง	กลม	ใบ	สีเขียวอมเหลือง
ความสูง	5 - 8 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	3 - 4 ม.	ดอก	-
ผิวสัมผัส	ละเอียด	กลิ่น	-
ลำต้น	สีน้ำตาล	ช่วงการมีดอก	-

ลักษณะนิสัย

ดิน	แทบทุกชนิด	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	-

อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1.5 - 3 ม. ห่าง 4 - 5 ม.

การใช้งาน :

- ปลูกเป็นกลุ่มแทนไม้ระดับกลางสูงแล้วตัดแต่งเพื่อทำรั้ว
- ปลูกต้นเดี่ยวเพื่อให้ร่มเงาหรือประดับสวน
- เป็นไม้กลุ่มเดียวกับแปรงล้างขวด
- รูปทรงปิรามิดเมื่อต้นมีขนาดเล็ก

54. หูกระจง

ชื่อสามัญ : Black afara
ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia ivoriensis A Chev.

ลักษณะ

รูปทรง	แผ่เป็นชั้นๆ	ใบ	สีเขียว เห็นเป็นชั้นๆ
ความสูง	15 - 20 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	4 - 5 ม.	ดอก	สีขาว
ผิวสัมผัส	ละเอียด	กลิ่น	-
ลำต้น	สีน้ำตาล	ช่วงการมีดอก	ก.พ. - เม.ย.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	หนอนแดงกินเปลือกไม้

อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 5 – 8 ม. ห่าง 10 – 15 ม.



การใช้งาน :

- ปลูกประดับให้ร่มเงาหน้าอาคาร ริมถนน ลานจอดรถเพราะพุ่มใบละเอียด แผ่เป็นชั้นๆ สวยงามมาก แข็งแรง โตเร็ว ไม้ริมทะเล
- ควรปลูกให้มีระยะห่าง 8 เมตร พุ่มใบจึงจะแผ่อย่างสวยงาม
- ถ้าระบบรากกระทบกระเทือนใบจะร่วงง่าย แต่ก็แตกใบใหม่ได้ง่าย ควรขุดล้อมคาหลุมนาน 2 เดือน จึงจะเคลื่อนย้ายต้น



55. เหลืองอินเดีย

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson

ลักษณะ

รูปทรง	ไข่	ใบ	สีเขียวเข้ม
ความสูง	5 – 10 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	5 – 8 ม.	ดอก	สีเหลืองสด
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	-
ลำต้น	สีน้ำตาลเข้ม	ช่วงการมีดอก	มี.ค. – เม.ย.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ปนทราย ระบายน้ำดี	ความชื้น	ปานกลาง - ต่ำ
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	หนอนเจาะลำต้นและกิ่ง

อัตราการเจริญเติบโต : ช้า
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 3 – 4 ม. ห่าง 5 – 8 ม.

การใช้งาน :

- ดอกดกและมีสีสะดุดตาแต่จะบาน 2 – 3 วัน ควรปลูกบนเนิน
- ไม่ควรปลูกจำนวนมากนักเพราะโตช้า ไม่ชอบดินกรดจัดและน้ำขัง
- หาขนาดใหญ่และปริมาณมากไม่ได้ ชอบอากาศเย็น

56. อโศกอินเดีย (อโศกเซนคาเบรียล)

ชื่อสามัญ : Cemetary tree
ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyalthia longifolia Benth. & Hook. f. var. pandurata

ลักษณะ

รูปทรง	ปิรามิด	ใบ	สีเขียวอ่อน รูปหอกเรียงยาว
ความสูง	6 – 15 ม.	☑ ไม่ผลัดใบ	☐ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	1.5 – 3 ม.	ดอก	สีครีม
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	-
ลำต้น	สีน้ำตาล	ช่วงการมีดอก	มี.ค. - เม.ย.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ทั่วไป	ความชื้น	ปานกลาง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	เพลี้ยไฟทำให้ยอดหงิก

อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1.5 – 2 ม. ห่าง 2.5 – 3 ม.



การใช้งาน :

- นิยมปลูกเป็นแถวระยะ 1.5 เมตร ทำให้พุ่มใบชนกันพอดี ช่วยบังสายตาในพื้นที่จำกัดหรือปลูกเป็นแนวขอบเขตพื้นที่
- ควรตัดใบด้านล่างให้โคนต้นโล่งสูง 1 เมตร ทรงพุ่มจะดูสวยงาม
- ตัดแต่งควบคุมความสูงได้ตามต้องการ โดยการตัดยอด
- ช่วยกรองฝุ่น กรองเสียงได้ดี

57. อินทนิลน้ำ

ชื่อสามัญ : Queen's flowers, Pride of India
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia speciosa (L.) Pers

ลักษณะ

รูปทรง	กลม	ใบ	ใบเล็กกว่าอินทนิลบก
ความสูง	8 – 25 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	4 – 5 ม.	ดอก	สีม่วง ชมพู ขาว
ผิวสัมผัส	หยาบ	กลิ่น	-
ลำต้น	สีเทาปนดำ เปลือกตะปุ่มตะป่ำ ลอกเป็นสะเก็ด	ช่วงการมีดอก	ออกมาก มี.ค. – มิ.ย. เกือบตลอดปี

ลักษณะนิสัย

ดิน	ร่วน	ความชื้น	ปานกลาง - สูง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	แมลงกินใบ

อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 4 – 5 ม. ห่าง 6 – 8 ม.



การใช้งาน :

- นิยมปลูกตกแต่งสวนหรือปลูกริมถนนเพราะมีดอกสวยงาม ทรงพุ่มไม่ใหญ่มาก ปัญหาน้อย
- ทนน้ำขังชั่วคราวได้ดีกว่าเสลาใบใหญ่

58. อินทนิลบก

ชื่อสามัญ : Queen crapemyrtle, Queen of flowers
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia macrocarpa Wall.

ลักษณะ

รูปทรง	รูปไข่	ใบ	หนา สีเขียวเข้มเป็นมัน ปลายใบทู่
ความสูง	8 – 20 ม.	☐ ไม่ผลัดใบ	☑ ผลัดใบ
ขนาดทรงพุ่ม	5 – 6 ม.	ดอก	สีม่วงเข้ม ม่วงอ่อน ชมพูอ่อน
ผิวสัมผัส	หยาบ		ชมพูอมม่วง ดอกใหญ่กว่าอินทนิลน้ำ
ลำต้น	สีน้ำตาลอ่อน แตกเป็นร่องตื้น ลอกเป็นสะเก็ดได้		กลีบดอกแยกกันชัดเจน
		กลิ่น	-
		ช่วงการมีดอก	ก.พ. – มี.ค.

ลักษณะนิสัย

ดิน	ร่วน	ความชื้น	ปานกลาง - สูง
แสง	แดดเต็มวัน	โรค/แมลง	แมลงกินใบ

อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 4 – 5 ม. ห่าง 6 – 8 ม.

การใช้งาน :

- นิยมปลูกตกแต่งสวนหรือปลูกริมถนนเพราะมีดอกสวยงาม ทรงพุ่มไม่ใหญ่มาก ปัญหาน้อย
- พบมากทางภาคเหนือของไทย ค่อนข้างชอบอากาศเย็น การระบายน้ำดี
- ใบใหญ่จะหนาและเขียวเข้มกว่าอินทนิลน้ำ
- ผลและดอกจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มของเสลา ตะแบก อินทนิล



ไม้พุ่มสูง (ไม้ระดับกลาง-ใหญ่)

Medium Plants - Large

1. กรรณิการ์

ชื่อสามัญ : Night blooming jasmine
ชื่อวงศ์ : OLEACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nyctanthes arbor – tristis L.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : ปิรามิด ความสูง : 2 - 4 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 2 - 3 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาล ใบ : สีเขียว ดอก: สีขาว ตรงกลางเป็นหลอดสีส้ม ก้านดอกเป็นเหลี่ยมสีส้มอมแสดบานตอนเย็น กลิ่น : หอมกลางคืน ตอนเช้าดอกจะร่วง ช่วงการมีดอก : ส.ค. - พ.ย.	ดิน : ร่วน ระบายน้ำดี ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : หนอนไชลำต้น กิ่งหัก อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1.5 - 2 ม. ห่าง 2 - 3 ม. **การใช้งาน:** ▪ เหมาะในพื้นที่แคบ เพราะรูปทรงสามเหลี่ยมสูง ▪ ปลูกเป็นฉากหลังของสวน บังสายตา ▪ เหมาะกับสวนไม้หอม กลิ่นหอมเป็นจุดเด่น

2. กาหลง

ชื่อสามัญ : Snowy orchid tree
ชื่อวงศ์ : LEG. - CAESALPINIOIDEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia acuminata L.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 2 - 3 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 1.5 - 2 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : สีน้ำตาล ใบ : สีเขียว ดอก: สีขาว กลิ่น : หอมอ่อนๆ ช่วงการมีดอก : หมุนเวียนตลอดปี	ดิน : ร่วน ขึ้นได้ในดินทุกชนิด เช่น ดินทราย ดินเนินเขา ระบายน้ำดี ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : ไรแดง อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1 - 1.5 ม. ห่าง 2 - 3 ม. **การใช้งาน:** ▪ นิยมปลูกเป็นกลุ่มร่วมกับชงโค โยทะกา เพราะมีลักษณะคล้ายกัน ▪ ดอกสีขาวสวยงามมาก ปลูกชิดกันแล้วตัดแต่งเป็นแปลงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 1 - 2 เมตร ▪ ควรปลูกไม้พุ่มเตี้ยด้านหน้าเพื่อบังโคนต้นที่โล่งมาก ▪ ควรตัดฝักแห้งทิ้ง เพราะจะไม่ร่วงจากต้นมองดูไม่สวยงาม

3. แก้ว

ชื่อสามัญ : Andaman satinwood Chinese box tree,Orange jessamine
ชื่อวงศ์ : RUTACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Murraya paniculata (L.) Jack

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 5 - 10 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 3 - 5 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาลแตกเป็นร่อง ใบ : สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก: สีขาว กลิ่น : หอมแรงเวลาเช้า ช่วงการมีดอก : หมุนเวียนเป็นช่วงๆ ตลอดปี โดยเฉพาะหลังฤดูฝน	ดิน : ดินปนทราย แต่ไม่ชอบดินเหนียว ความชื้น : ปานกลาง - ต่ำ แสง : แดดเต็มวัน – ร่ำไร (แต่จะไม่มีดอก) โรค/แมลง : - อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1.5 - 2 ม. ห่าง 3 - 4 ม. **การใช้งาน:** ▪ นิยมปลูกต้นเดียว หรือปลูกเป็นกลุ่มบังสิ่งไม่สวยงาม ▪ ตัดแต่งเป็นทรงพุ่มรูปร่างต่างๆ หรือเป็นรั้วได้ ▪ ปลูกในที่ร่มร่ำไรได้ แต่ไม่มีดอก ▪ ไม้ริมทะเล ▪ กระรอกชอบแทะเปลือกลำต้นและกิ่งของแก้วต้นใหญ่ ทำให้กิ่งแห้งตาย

4. แก้วเจ้าจอม

ชื่อสามัญ : Lignum vitae
ชื่อวงศ์ : ZYGOPHYLLACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Guaiacum officinale L.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่กลม ความสูง : 2 - 9 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 5 - 6 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีเทาเข้ม ใบ : สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก: สีฟ้า ออกเป็นกระจุก กลิ่น : หอม ช่วงการมีดอก : ส.ค. - ต.ค.	ดิน : ร่วน ระบายน้ำดี ความชื้น : ปานกลาง แสง : ปานกลาง โรค/แมลง : ขอบใบไหม้เมื่อแดดจัดเกินไป อัตราการเจริญเติบโต : ช้า ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 2 - 3 ม. ห่าง 5 - 6 ม. **การใช้งาน:** ▪ ปลูกเป็นจุดเด่นเช่น บริเวณใกล้ศาลาหรือลานนั่งเล่น เพราะพุ่มใบและดอกสวยงาม ▪ ควรปลูกใกล้สวนหย่อม เพราะโตช้า

5. เข็มกุดั่น

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : AGAVACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Yucc aspp.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แตกพุ่มที่ยอดและด้านข้าง ความสูง : 1 - 4 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.6 - 1.5 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : สีน้ำตาล เป็นกอและแตกหน่อ ใบ : สีเขียวแก่ เรียงเวียนแบบกุหลาบ ใบรูปดาบแข็ง ปลายใบแหลมแข็ง ดอก: สีขาว กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : เมื่อโตเต็มที่	ดิน : ร่วนปนทราย ความชื้น : น้อย แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : - อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 0.6 - 1 ม. ห่าง 2 - 3 ม. **การใช้งาน:** ▪ เป็นไม้ประธานสวนหย่อม ▪ เหมาะกับสวนที่มีพื้นที่กว้างเพราะใบแหลม ▪ เหมาะกับสวนหิน ชอบน้ำน้อย

6. เข็มขาว

ชื่อสามัญ : Siamese white ixora
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora finlaysoniana Wall. ex G. Don

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 1.5 - 6 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 1 - 2 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : สีน้ำตาล ใบ : สีเขียวเข้ม ดอก: สีขาว กลิ่น : หอม ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : แทบทุกชนิด ความชื้น : ทนแล้งพอประมาณ แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : ช่อดอกไม่บานเนื่องจากมีเชื้อไมโคพลาสมา และราดำที่ใบ อัตราการเจริญเติบโต : ช้า ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1 ม. 25/m^2 (6") ห่าง 2 - 3 ม. 16/m^2 (6") **การใช้งาน:** ▪ ปลูกเป็นกลุ่มริมรั้ว(ใช้ต้นเล็ก) หรือปลูกต้นเดียวมุมอาคาร(ใช้ต้นใหญ่) ▪ เป็นไม้ประธานสวนหย่อม ควรใช้สูง 1.5 – 2 เมตร เพราะโตช้า ▪ ใช้ต้นเดี่ยวจะมีพุ่มสวยงามมากกว่าปลูกเป็นกลุ่ม



7. เข็มสามสี

ชื่อสามัญ : Rainbow tree
ชื่อวงศ์ : DRACAENACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena cincta Bak. 'Tricolor'

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แตกพุ่มที่ยอด ความสูง : 1 - 3 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 - 0.6 ม.. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน ใบ : 3 สี เขียว ครีมหรือเหลือง แดง ดอก: - กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : เมื่อต้นสมบูรณ์	ดิน : ร่วนหรือดินปนทราย ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : ขอบใบแห้งเป็นสีน้ำตาล เนื่องจากน้ำมากเกินไป อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 16/m^2 (6") ห่าง ต้นเดี่ยว 12/m^2 (6") **การใช้งาน:** ▪ นิยมปลูกเป็นกลุ่ม โดยเน้นสีและรูปทรงของใบ ให้เข้ากับไม้จัดสวนชนิดอื่น ▪ ต้นใหญ่ใช้เป็นประธานในสวนหย่อมได้ ไม้ริมทะเล ▪ ไม่ควรปลูกใต้หน้าต่าง เพราะต้องตัดแต่งทำให้รูปทรงไม่สวยงาม ▪ สีใบสดใส ควรปลูกใกล้ไม้สีเขียวหรือสีน้ำตาล

8. จั๋งจีน

ชื่อสามัญ : Lady palm, Reed rhapis
ชื่อวงศ์ : PALMAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhapis humilis Blume

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แตกกอ ความสูง : 2 - 4 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 1.5 - 3 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : สีน้ำตาลเข้มขนาดเล็ก แตกกอ แตกหน่อ ใบ : สีเขียวมัน รูปพัด ใบเป็นแฉก 20-30 แฉก ดอก: สีครีม กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ดินร่วน - ร่วนปนเหนียว ความชื้น : สูง แสง : แดดเต็มวัน - ร่ม โรค/แมลง : - อัตราการเจริญเติบโต : ช้า ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1 - 1.5 ม. ห่าง 2 – 3 ม. **การใช้งาน:** ▪ ปลูกเป็นกอเดี่ยวตามมุมอาคารที่ไม่มีชายคา เป็นไม้ประธานในสวนหย่อมที่ค่อนข้างร่ม ไม้ริมทะเล ▪ ไม้ประดับอาคารหรือพื้นที่ที่ได้รับแสงรำไร ใบจะเขียวเป็นมันมากกว่าปลูกกลางแจ้ง ▪ ใช้เวลานาน 6 เดือนถึง 1 ปี เพื่อตั้งตัวหลังจากแยกกอแล้ว

9. ดอนญ่าขาว (ดอนญ่าออโรร่า); ดอนญ่าลูซ

ชื่อสามัญ : Dona Aurora, Virgin tree ; Dona luz, Buddha's lamp
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mussaenda philippica A. Rich 'Dona Aurora' ;
M. philippica A. Rich 'Dona Luz'

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 1.5 - 2.5 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 1.5 - 2 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : สีน้ำตาล ใบ : สีเขียวอ่อน มีขน ดอก: สีเหลืองขนาดเล็ก ใบประดับ สีขาว;ใบประดับสีชมพู กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : เกือบตลอดปี	ดิน : ทั่วไปที่ระบายน้ำดี ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดจัดเต็มวัน โรค/แมลง : ราดำ หนอนกัดกินใบ เพลี้ยแป้ง อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1 - 1.5 ม. ห่าง 2 - 3 ม. **การใช้งาน:** ▪ ปลูกเป็นไม้พุ่มในที่กว้างๆ และมองจากระยะไกลๆ ▪ ปลูกเป็นฉากบังกำแพง ▪ ดอนญ่าออโรร่าเป็นที่นิยมปลูกมากกว่าดอนญ่าชนิดอื่นๆ เพราะพุ่มเตี้ยมีใบประดับสีขาวตลอดปี



10. ทรงบาดาล

ชื่อสามัญ : Scrambled eggs
ชื่อวงศ์ : LEG. - CAESALPINIOIDEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Senna surattensis (Burm.f.) Irwin & Barneby

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 3 - 7 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 2.5 - 3 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาล ใบ : สีเขียว ด้านล่างมีขนเล็กน้อย ดอก: สีเหลืองรูปไข่ กลีบไม่เท่ากัน กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ทั่วไป ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : ราสนิมในฤดูหนาว อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1.5 - 2 ม. ห่าง 4 - 5 ม. **การใช้งาน:** ▪ ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ ปลูกริมทะเลได้ ทนลมแรง ▪ ปลูกริมถนนใต้สายไฟได้ เพราะไม่สูงมากนัก ▪ ปลูกเป็นฉากหลังในสวนสาธารณะ ▪ ไม่เหมาะในบ้านขนาดเล็ก เพราะพุ่มแผ่กว้าง

11. ทองอุไร

ชื่อสามัญ : Yellow bell, Yellow elder, Yellow trumpet flower
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tecoma stans (L.) Kunth

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 2 - 5 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 2 - 3 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน ใบ : สีเขียวอ่อน ดอก: สีเหลืองสด กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ร่วน ระบายน้ำดี ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : เพลี้ยอ่อนและมด อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1.5 - 2 ม. ห่าง 3 - 4 ม. **การใช้งาน:** ▪ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เพื่อบังสายตา ให้ดอกสวยงาม ▪ ปลูกใน กทม. จะไม่ค่อยสวย เพราะระดับน้ำใต้ดินสูง รากเน่าตาย ▪ ไม้ริมทะเล

12. เทียนหยด (ช่อม่วง)

ชื่อสามัญ : Golden dew drop
ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dutanta erecta L.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : ไข่ ความสูง : 1 - 3 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 1 - 2 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน ใบ : สีเขียว ดอก: สีขาว ม่วง เมล็ดสีเหลือง กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : แทบทุกชนิด ความชื้น : ปานกลาง - ต่ำ แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : หนอนไชกิ่ง อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1 - 1.5 ม. (12/ม^2) ห่าง 2 - 3 ม. (9/ม^2) **การใช้งาน:** ▪ ปลูกเป็นกลุ่มบังกำแพง ทำเป็นรั้วหรือปลูกมุมบ้าน ▪ ผลเป็นพิษ ▪ สามารถตัดแต่งให้มีระดับต่ำได้ถึง 50 ซม. ▪ ไม้ริมทะเล ▪ ปลูกริมถนน แล้วตัดแต่งให้โคนต้นโล่ง

13. ไทรทอง

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus microcarpa L.f. 'Golden Leaves'

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่กว้าง ความสูง : 5 - 10 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 3 - 5 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาล ใบ : สีเหลืองปนเขียว ดอก: - กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : -	ดิน : ทั่วไป ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : หนอนกินใบ อัตราการเจริญเติบโต : ช้า ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 25/m^2 (bag) ห่าง ต้นเดี่ยว 16/m^2 (bag) **การใช้งาน:** ▪ นิยมปลูกเป็นรั้ว ไม่ควรตัดต่ำกว่า 50 ซม. ▪ ต้องการแดดจัดเพื่อให้ใบมีสีทอง ในร่มใบจะเขียว ทนน้ำท่วมขังแฉะ ▪ เหมาะในที่สาธารณะ ปลูกริมถนน ไม้ริมทะเล ทนลมแรง

14. นีออน

ชื่อสามัญ : Texas ranger, Texas sage, Barometer bush
ชื่อวงศ์ : SCROPHULARIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Leucophyllum frutescens (Berl.) I.M. Johnst.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 3 - 4 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 1 - 2 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาล ใบ : สีเทา ท้องใบสีเงินหรือสีอ่อนกว่า ดอก: สีม่วง กลิ่น : เหม็น ช่วงการมีดอก : ออกดอกหลายครั้ง ในรอบปี	ดิน : แทบทุกชนิด ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : ราดำในฤดูฝน เพลี้ยแป้ง (ต้องพ่นยากันราและฆ่าแมลงเป็นครั้งคราว) อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1.5 - 2 ม. ห่าง 2.5 - 3 ม. **การใช้งาน:** ▪ ให้สีอ่อนสว่างกับบริเวณ ▪ สามารถปล่อยรูปทรงตามธรรมชาติ หรือตัดแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ ▪ ไม่ควรปลูกในที่ร่ม เพราะใบจะเป็นสีเขียวไม่สวย ▪ ไม้ริมทะเล ▪ ปลูกต้นเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มได้

15. ประยงค์

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aglaia odorata Lour.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 1 - 3 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.7 - 1.5 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน ใบ : สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก: สีเหลือง กลิ่น : หอมอ่อนๆ ดอกบาน 1 - 2 วัน ช่วงการมีดอก : ปีละ 1 - 2 ครั้ง	ดิน : ทุกชนิด ระบายน้ำดี ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดครึ่งวัน โรค/แมลง : หนอนไชต้น อัตราการเจริญเติบโต : ช้า ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1 - 1.5 ม. ห่าง 2 - 3 ม. **การใช้งาน:** ▪ ใบคล้ายใบแก้วแต่เล็กกว่า ทรงพุ่มแน่น ชอบแสงครึ่งวัน ▪ ไม่นิยมใช้เป็นแปลง นิยมปลูกต้นเดียวมากกว่า ▪ ไม่ควรใช้ไม้ขุดล้อม ถ้าจะใช้ควรพักตัวนานจนสภาพสมบูรณ์ ▪ เหมาะกับสวนไม้หอมและสวนไทย

16. พู่จอมพล

ชื่อสามัญ : Red powderpuff , Red head powderpuff
ชื่อวงศ์ : LEG. - MIMOSOIDEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calliandra haematocephala Hassk

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่กว้าง ความสูง : 3 - 6 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 2 - 4 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาลเข้ม ใบ : สีเขียวแก่เป็นมัน ดอก: สีแดง ขาว กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ธ.ค. - เม.ย.	ดิน : ร่วน ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : - อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1.5 - 2 ม. ห่าง 3 - 4 ม. **การใช้งาน:** ▪ ใช้ในบริเวณที่กว้างพอควร ปลูกเป็นไม้ริมถนน ▪ ใบและดอกละเอียดมองดูนิ่มนวล สวยงามแต่สีไม่เด่นมาก ▪ แข็งแรงและทนทานดี แต่ใบจะเหี่ยวเฉาเมื่อขาดน้ำ

17. พู่ชมพู

ชื่อสามัญ : Pink powderpuff
ชื่อวงศ์ : LEG. - MIMOSOIDEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calliandra surinamensis Benth.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่กว้าง ความสูง : 2 - 6 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 2 - 3 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีเขียวเข้ม - น้ำตาล ใบ : สีเขียวเข้มสดใส ดอก: สีชมพู กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : หมุนเวียนตลอดปี	ดิน : แทบทุกชนิด ยกเว้นดินเหนียว ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : โรคราสนิมที่ใบและรากเน่า เมื่อได้รับน้ำมากเกินไป อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1.5 - 2 ม. ห่าง 3 - 4 ม. **การใช้งาน:** ▪ ปลูกเป็นกลุ่ม 3 ต้น เพื่อบังกำแพง ▪ ปลูกตรงมุมอาคารที่ผนังทึบ ▪ เลี้ยงง่าย มีดอกตลอดปี ▪ ปลูกริมถนน ▪ ต้องการน้ำสม่ำเสมอ มิฉะนั้นใบจะเหี่ยวง่าย

18. มะขามเทศด่าง

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : LEG. - MIMOSOIDEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 'Variegata'

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 2 - 4 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 1 - 3 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน ใบ : สีเขียวกับขาว ใบอ่อนมีสีชมพูปน ดอก: สีขาว กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ทนดินเลวได้ดี ความชื้น : ต่ำ ทนแล้งได้ดี แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : หนอนกัดกินใบ อัตราการเจริญเติบโต : ช้า ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 16/ม^2 (6") ห่าง ต้นเดี่ยว 9/ม^2 (6") **การใช้งาน:** ▪ เป็นไม้ประธานสวนหย่อม ปลูกเป็นฉากบังกำแพง ▪ ตัดแต่งทรงพุ่มได้ แต่ไม่ควรตัดต่ำกว่า 0.5 เมตร ▪ นิยมใช้เพราะใบอ่อนสีชมพูสวยงาม ▪ ไม้ริมทะเล

19. มิกกี้เม้าส์

ชื่อสามัญ : Mickey mouse plant
ชื่อวงศ์ : OCHNACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ochna kirkii Oliv.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 1.5 - 5 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 1 - 3 ม. ผิวสัมผัส : ปานกลาง ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน ใบ : สีเขียวเข้ม ดอก: สีเหลือง ฐานรองดอกสีแดง กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ร่วน ความชื้น : ปานกลาง แสง : ปานกลาง โรค/แมลง : - อัตราการเจริญเติบโต : ช้า ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1 - 1.5 ม. ห่าง 2 - 2.5 ม. **การใช้งาน:** ▪ ผลสีแดงและดำคล้ายหน้ามิกกี้เม้าส์ พุ่มใบไม่แน่น ▪ ควรปลูกใกล้ศาลา ทางเดินในสวน จะมองเห็นดอกและผลได้ชัดเจน ▪ ตำแหน่งที่ปลูกควรได้รับแสงแดดเพียง 30 – 50 % จะดี

20. โมก โมกลา

ชื่อสามัญ : โมกซ้อน โมกพวง
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia religiosa Benth. ex Kurz

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่กว้าง ความสูง : 1 - 3 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 1 - 1.5 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาลดำ มีจุดระบายอากาศสีขาว ใบ : สีเขียว ทิ้งใบฤดูหนาว	ดอก: สีขาว มีทั้งดอกลาและดอกซ้อน กลิ่น : หอม ช่วงการมีดอก : หมุนเวียนตลอดปี ดิน : ทุกชนิด ยกเว้นดินทราย ความชื้น : ปานกลาง - สูง แสง : แดดเต็มวัน - รำไร โรค/แมลง : ใบเหลืองเพราะขาดปุ๋ยและน้ำ อัตราการเจริญเติบโต : ช้า - ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1.5 - 2 ม. ห่าง 2 - 3 ม.

การใช้งาน:
- ใช้เป็นไม้ประธานในสวนหย่อม ปลูกบริเวณริมน้ำตก สร้างบรรยากาศเป็นป่า ทนน้ำท่วมขัง เป็นไม้ริมทะเล ทำเป็นไม้ดัดได้
- ปลูกตามมุมอาคารที่มีชายคาเพราะตัดแต่งพุ่มได้ ไม่ควรปลูกในที่มีลมแรงเพราะใบร่วงง่าย
- เป็นที่นิยมมาก เพราะดอกมีกลิ่นหอมตลอดปีและเลี้ยงดูง่าย
- โมกลาติดฝักง่ายและทรงพุ่มสวยงามกว่าโมกซ้อน แต่ออกดอกไม่บ่อยเท่าโมกซ้อน โมกพวงเลี้ยงง่าย ทรงพุ่มใบสวยและมีดอกง่ายที่สุด
- ถ้าปลูกชิดกันเป็นแนวรั้วควรปลูกห่าง 0.3 เมตร

21. ยี่โถ

ชื่อสามัญ : Sweet oleander, Rose bay
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nerium oleander L.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่กว้าง ความสูง : 2 - 6 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 2 - 3 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : เปลือกสีเทา ใบ : สีเขียว ดอก: สีขาว แดง ชมพูอ่อน ชมพูเข้ม เหลือง กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ระบายน้ำดี ความชื้น : สูง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : หนอนแก้ว อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1 - 1.5 ม. ห่าง 2 - 3 ม. **การใช้งาน:** ▪ ไม้ประดับกลางแจ้งทรงพุ่มค่อนข้างแน่น ดอกสีสดใส เหมาะกับสวนสาธารณะ รีสอร์ท ไม้ริมทะเล ปลูกริมถนน ทนแล้งได้ดีมาก ▪ หนอนกินใบและเจาะลำต้น ▪ เหมาะกับสถานที่ที่มีการดูแลน้อย เนื่องจากยางเป็นพิษ ไม่เหมาะในสนามเด็กเล่น

22. โยทะกา

ชื่อสามัญ : St. Thomas tree, Yellow bauhinia
ชื่อวงศ์ : LEG. - CAESALPINIOIDEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia tomentosa L.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : ไข่ ความสูง : 2 - 4 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 1 - 2 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาล มีขน ใบ : สีเขียวอ่อน ดอก: สีเหลือง กลิ่น : หอม ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ร่วน ความชื้น : ปานกลาง แสง : ปานกลาง โรค/แมลง : ใบจุดสนิม ไรแดง อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1 - 1.5 ม. ห่าง 2 - 3 ม. **การใช้งาน:** ▪ รูปทรงสวยงามและออกดอกตลอดปี โตเร็ว เลี้ยงง่าย ▪ ควรปลูก 2 - 3 ต้นในหลุมเดียว ตัดแต่งทรงพุ่มให้สวย กว้าง 0.5 - 1 เมตร แล้วขุดล้อมมาขาย ▪ ถ้าน้ำขังใบจะร่วง

23. รำเพย

ชื่อสามัญ : Yellow oleander, Lucky nut
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 2 - 4 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 2 - 3 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน ใบ : สีเขียวสดเป็นมัน ดอก: สีขาว เหลือง ส้ม กลิ่น : มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ทราย ความชื้น : ต่ำ แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : - อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1 - 1.5 ม. ห่าง 3 - 4 ม. **การใช้งาน:** ▪ พุ่มแน่น ปลูกเป็นไม้บังสายตาหรือเป็นฉากหลัง ▪ ทนแล้งได้ดี ดูแลรักษาต่ำ เหมาะกับสวนสาธารณะทั่วไป ▪ ยางและผลเป็นพิษ ไม่เหมาะกับสนามเด็กเล่น ▪ ปลูกริมถนน ตัดแต่งให้โค่นต้นโล่ง เดินผ่านได้

24. สนบลู

ชื่อสามัญ : Lawson's cypress, Oregon ceder
ชื่อวงศ์ : CUPRESSACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chamecyparis lawsoniana (Murray) Parl.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : ปิรามิด ความสูง : 2 - 10 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.6 - 1 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาล ใบ : สีเขียวปนเทา ดอก: - กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : -	ดิน : ร่วน ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเช้าหรือเต็มวัน โรค/แมลง : - อัตราการเจริญเติบโต : ช้า ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 0.8 - 1 ม. ห่าง 1.5 - 2 ม. **การใช้งาน:** ▪ ใช้เป็นรองประธานประกอบสวนหย่อมแบบสวนสน ▪ นิยมปลูกเป็นกลุ่ม 3 ต้น ▪ ควรใช้ไม้คลุมดินที่มีสีคล้ายกัน เช่น แอหนัง ฟ้าประดิษฐ์ ▪ รดน้ำเฉพาะที่โคน ไม่ควรรดที่พุ่มใบ เพราะจะทำให้พุ่มใบห้อยลง ▪ ชอบอากาศเย็น

25. หมากเขียว

ชื่อสามัญ : MacArthur palm
ชื่อวงศ์ : PALMAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ptychosperma macarthurii H. Wendl. ; P. elegans (R. Br.) Blume

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แตกกอ	ดิน : ร่วน
ความสูง : 3 - 6 ม.	ความชื้น : ปานกลาง
ขนาดทรงพุ่ม : 1.5 - 2.5 ม.	แสง : แดดเต็มวัน
ผิวสัมผัส : หยาบ	โรค/แมลง : -
ลำต้น : สีเทาอ่อนหรือน้ำตาลปนเทา เรียบเห็นข้อปล้องชัดเจน	อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ใบ : สีเขียวแก่ - อ่อน ปลายใบย่อยแหลม; ปลายใบย่อยตัด	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1 - 1.5 ม. ห่าง 2.5 - 3 ม.
ดอก: สีครีม	การใช้งาน:
กลิ่น : -	▪ ปลูกเป็นฉากกั้นสายตาหรือเป็นรั้วที่ได้รับแสงครึ่งวันเช้า
ช่วงการมีดอก : เมื่อต้นสมบูรณ์	▪ ปลูกมุมอาคารที่ไม่มีชายคา หรือหลังคา
	▪ เหมาะปลูกริมสระว่ายน้ำ เพราะใบใหญ่เก็บกวาดง่าย
	▪ นิยมใช้ประดับในอาคาร ไม้ริมทะเล

26. หมากเหลือง

ชื่อสามัญ : Madagascar plam, Yellow palm , Yellow bamboo palm, Butterfly palm
ชื่อวงศ์ : PALMAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chrysalidocarpus lutescens (Bory) H.A. Wendl.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แตกกอ	ดิน : ดินปนทราย
ความสูง : 3 - 9 ม.	ความชื้น : ปานกลาง
ขนาดทรงพุ่ม : 2 - 3.5 ม.	แสง : แดดเต็มวัน ในร่มใบจะเขียวเป็นมัน
ผิวสัมผัส : หยาบ	โรค/แมลง : -
ลำต้น : สีเขียวเห็นข้อชัด มีกาบใบสีเหลือง แตกกอ	อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ถ้าดินอุดมสมบูรณ์
ใบ : สีเหลืองอ่อนปนชมพูหรือส้มเล็กน้อย ใบรูปขนนกห้อยลงยาว 6 – 8 ฟุต	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1 - 1.5 ม. ห่าง 2 - 3 ม.
ดอก: สีครีม	การใช้งาน:
กลิ่น : -	▪ ปลูกเป็นไม้ประธานประดับในสวนหย่อมที่กว้าง
ช่วงการมีดอก : เมื่อต้นสมบูรณ์	▪ ปลูกเป็นฉากกั้นหรือเป็นแนวแบ่งเขตพื้นที่
	▪ ปลูกมุมอาคารที่ไม่มีชายคาหรือหลังคา
	▪ นิยมปลูกประดับในอาคาร ไม้ริมทะเล
	▪ ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อและเพาะเมล็ด โตง่าย

27. หางนกยูงไทย

ชื่อสามัญ : Barbados pride, Dwarf poinciana, Peacock flower
ชื่อวงศ์ : LEG. - CAESALPINIOIDEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม	ดิน : แทบทุกชนิด
ความสูง : 3 - 5 ม.	ความชื้น : ปานกลาง - ต่ำ
ขนาดทรงพุ่ม : 2 - 3 ม.	แสง : แดดเต็มวัน
ผิวสัมผัส : ละเอียด	โรค/แมลง : หนอนเจาะลำต้นถ้าแล้งมาก
ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน มีหนาม	อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
ใบ : สีเขียวนวล	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 1.5 - 2 ม. ห่าง 3 - 4 ม.
ดอก: สีแดง เหลือง ชมพู	การใช้งาน:
กลิ่น : -	▪ ปลูกเป็นกลุ่มเพื่อบังกำแพงหรือแสดงขอบเขตสวนที่มีขนาดใหญ่
ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	▪ ไม่ควรปลูกใกล้บ้านหรือทางเดินเพราะมีหนาม
	▪ เหมาะที่จะใช้ริมถนน เกาะกลางถนน สวนสาธารณะ เพราะทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้และมีดอกสีสดใสตลอดปี
	▪ ไม้ริมทะเล ทนลมแรง

ไม้พุ่มกลาง (ไม้ระดับกลาง-เล็ก)

Medium Plants - Small

1. ก้ามกุ้ง

ชื่อสามัญ : Lobster claw, Parrot's flower
ชื่อวงศ์ : HELICONIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Heliconia psittacorum L.f.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แตกกอ ความสูง : 1 – 2 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 1 – 1.5 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : เขียวอวบน้ำ ใบ : สีเขียวแก่ ดอก: สีชมพู แสด เหลือง กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ทุกชนิด ความชื้น : ปานกลาง - สูง แสง : แดดเต็มวัน - รำไร โรค/แมลง : เชื้อรา อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 0.6 ม. ห่าง 1 – 1.5 ม. (3/ม) **การใช้งาน:** ▪ ปลูกมุมอาคาร บังกำแพง ริมลำธาร น้ำตก ทนน้ำท่วมขังแฉะ ▪ ปลูกริมถนน ริมทะเล ▪ ดอกสีสดใส นำมาประดับแจกันได้ดีนานเกือบ 10 วัน ▪ ต้นไม้ที่ปลูกร่วมกับก้ามกุ้งได้ดี คือ มะผู้มะเมีย ลิ้นกระบือ กำแพงเงิน เฟิร์นใบมะขาม ฯลฯ

2. โกสน

ชื่อสามัญ : Croton
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Codiaeum variegatum (L.) Blume

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 1 - 2 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.7 - 1.5 ม. ผิวสัมผัส : ปานกลาง - หยาบ ลำต้น : สีน้ำตาล ใบ : หลากสี เช่น แดง เหลือง ลาย จุด ดอก: - กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : เมื่อต้นสมบูรณ์	ดิน : ดินร่วนผสมใบไม้ผุ และปุ๋ยอินทรีย์ ความชื้น : ปานกลาง ระบายน้ำดี แสง : แดดเต็มวัน บางพันธุ์ชอบร่มรำไร โรค/แมลง : เพลี้ยหอย เพลี้ยดำ อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 16/m² (6") ห่าง 12/m² (6") **การใช้งาน:** ▪ เป็นไม้พุ่มสูง ตัดแต่งให้เตี้ยที่สุดที่ 0.80 - 1.00 เมตร ▪ ควรใช้ชนิดเดียวกัน ปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้าง ▪ ไม่ควรใช้ต้นที่ขุดล้อม เพราะใบร่วงและจะแตกพุ่มใบช้ามาก ▪ ใช้เล่นสีตัดกับไม้สีเขียว เช่น แก้ว ชาฮกเกี้ยน จะเด่นมาก ▪ ถ้าให้ปุ๋ยมาก อาจชะลูดจนเสียทรง ▪ ปลูกริมถนน ริมทะเลได้

3. ขาไก่เขียว

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Justicia fragilis Wall.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 0.6 – 1.2 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 – 0.6 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาลเข้ม - ดำ ใบ : สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก: สีขาว กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : หมุนเวียนตลอดปี	ดิน : แทบทุกชนิด ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน - ปานกลาง โรค/แมลง : เพลี้ยแป้ง อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m² (bag) ห่าง 25/m² (bag) **การใช้งาน:** ▪ ปลูกทั่วไป ตามแปลงริมทางเดิน หรือข้างกำแพง ริมถนน ▪ ปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกใหม่ๆ และมีขนาดเล็กอยู่ เมื่อต้นไม้ใหญ่โตขึ้น ต้นขาไก่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแสงได้ ▪ ทำรั้วได้ ไม้ริมทะเล

4. ขาไก่ด่าง

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Justica fragilis Wall. 'Variegatum'

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 1 – 1.5 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 – 0.6 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีม่วงดำ ใบ : สีเขียวปนเงินด่างม่วงเป็นปื้น สีอ่อนแก่ไม่เสมอกันและด่างขาว ที่ริมขอบใบเข้าไปมากบ้างน้อยบ้าง ดอก: สีขาว กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ทั่วไป ความชื้น : ปานกลาง - ต่ำ แสง : แดดเต็มวัน - รำไร โรค/แมลง : โรคใบจุดสนิม อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m² (bag) ห่าง 25/m² (bag) **การใช้งาน:** ▪ นิยมปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแสงต่างๆ ได้ดี ▪ ปลูกเป็นกลุ่มในสวนหย่อมข้างกำแพงหรือทางเดิน ▪ เลี้ยงง่ายมาก ตัดแต่งได้ตามต้องการ ทำเป็นรั้วได้ ▪ ไม้ริมทะเล

5. ขาไก่ไทย

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sericocalyx schomburgkii (Craib) Bremek

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 0.6 – 1.2 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 – 0.6 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาลดำ ใบ : สีเขียวเป็นมัน ขอบใบสีส้ม ดอก: สีขาว กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : แทบทุกชนิด ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : - อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m² (bag) ห่าง 25/m² (bag) **การใช้งาน:** ▪ นิยมใช้มากเพราะดูแลรักษาง่าย ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว และตกแต่งทรงพุ่มได้สวยงาม สีสันสว่างกว่าขาไก่ทั่วไป ▪ ทำรั้วได้ ▪ ไม้ริมทะเล ปลูกริมถนนได้ เป็นไม้ถิ่นเดียวของไทย

6. ข้าวตอกพระร่วง

ชื่อสามัญ : Chinese privet
ชื่อวงศ์ : OLEACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ligustrum sinense Lour. 'Variegatum'

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แตกกิ่งก้านมาก ความสูง : 2 - 4 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 1 - 2 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน ใบ : สีเขียวอมเทา ขอบขาว ท้องใบสีอ่อน ดอก: สีขาว กลิ่น : หอม ช่วงการมีดอก : -	ดิน : ระบายน้ำดี ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน - ครึ่งวัน โรค/แมลง : หนอนกัดกินใบเล็กน้อย อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 6/m² (12") ห่าง ต้นเดี่ยว 3/m²(12") **การใช้งาน:** ▪ ผลัดใบฤดูหนาว ใบเป็นเส้นห้อยย้อยลง ▪ ปลูกริมน้ำตกสวยงาม ▪ ถ้าน้ำขังแฉะใบจะร่วง

7. เข็มเชียงใหม่; เข็มญี่ปุ่น

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora spp.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 0.3 – 1.5 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 – 0.8 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาลเข้ม ใบ : สีเขียวเข้มเป็นมัน ปลายใบแหลม ดอก: สีส้มแดง ; ส้ม กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : แทบทุกชนิด ความชื้น : ปานกลาง - ต่ำ แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : เพลี้ยแป้ง ราสนิม หนอนหลอดหอม หนอนปลอก อัตราการเจริญเติบโต : ช้า ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m² (bag) ห่าง 25/m² (bag) **การใช้งาน:** ▪ นิยมทำเป็นขอบแปลงและตัดแต่งเป็นทรงต่างๆในสวนประดิษฐ์ หรือทำรั้วถ้าไม่ตัดแต่งจะดูไม่เรียบร้อย ▪ ทนต่อสภาพแวดล้อมทั่วไปได้ดี แต่โตช้า ควรใช้ขนาดสูง 30 ซม. ▪ ราคาถูก หาง่ายในท้องตลาด ไม้ริมทะเล ริมถนน ▪ ควรให้ปุ๋ยบ้างจึงจะมีดอกงดงาม ▪ เข็มเชียงใหม่ช่อดอกใหญ่ ปลายกลีบดอกแหลม ใบเล็กแคบ 1 ซม. ▪ เข็มญี่ปุ่น ช่อดอกเล็ก ปลายกลีบดอกมน ใบใหญ่กว่ากว้าง 2 ซม.

8. เข็มพิษณุโลก

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora hybrid

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 0.3 – 0.5 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 – 0.4 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาลเข้ม ใบ : สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก: สีชมพู, ขาว กลิ่น : หอมอ่อนๆ ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ร่วนซุย ความชื้น : ปานกลาง ทนแล้งได้ แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : เชื้อรา อัตราการเจริญเติบโต : ช้า ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m² (bag) ห่าง 25/m² (bag) **การใช้งาน:** ▪ เหมาะปลูกในสวนหย่อมเพราะโตช้า ตัดแต่งทรงพุ่มได้ และมีช่อดอกใหญ่ ออกดอกตลอดปีสวยงาม ▪ ควรใส่ปุ๋ยเร่งดอกทุก 2 สัปดาห์ ▪ ใช้ทำรั้วเตี้ยๆได้ ไม้ริมทะเล ▪ เวลาปลูกให้พุ่มใบห่างกัน 2 นิ้ว เพราะถ้าปลูกห่างเกินไป จะใช้เวลามากกว่า 6 เดือน พุ่มจึงจะชิดกัน

9. เข็มเศรษฐี

ชื่อสามัญ : West Indian jasmine
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora longifolia Sm.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : ไข่ ความสูง : 1 – 3 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.5 – 1.5 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : สีน้ำตาล ใบ : สีเขียวเป็นมัน ดอก: สีแดง แดงอมแสด กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : แทบทุกชนิด ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : เพลี้ยอ่อนและมดที่ก้านช่อดอก อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 16/m² (6") ห่าง 12/m² (6") **การใช้งาน:** ▪ ปลูกเป็นกลุ่มเพื่อบังสายตาหรือแสดงขอบเขต ▪ นิยมปลูกริมกำแพงหรือบริเวณที่มีพื้นที่กว้าง เพราะพุ่มใบใหญ่ และมีดอก ไม้ริมทะเล ▪ ถ้าตัดแต่งบ่อยจะไม่มีดอก ไม่นิยมตัดต่ำกว่า 1 เมตร ▪ นิยมใช้จัดสวนเพราะดอกใหญ่ สีสด เลี้ยงง่ายและโตเร็ว

10. เข็มเหลือง

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora chinensis Lam.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 1 – 2 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.5 – 1 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : สีน้ำตาล ใบ : สีเขียว ดอก: สีเหลือง กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ทั่วไป ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : - อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 16/m² (6") ห่าง ต้นเดี่ยว 12/m² (6") **การใช้งาน:** ▪ ปลูกเป็นกลุ่มเพื่อบังสายตาหรือแสดงขอบเขต ▪ นิยมปลูกริมกำแพงหรือบริเวณที่มีพื้นที่กว้าง เพราะพุ่มใบใหญ่และมีดอก ▪ ถ้าตัดแต่งบ่อยจะไม่มีดอก ไม่นิยมตัดต่ำกว่า 1 เมตร ▪ นิยมใช้จัดสวนเพราะดอกใหญ่ สีสด เลี้ยงง่ายและโตเร็ว ▪ ไม้ริมทะเล

11. ชบา

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : MALVACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus rosa – sinensis L. and hybrid

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : ไข่ ความสูง : 1 – 2 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 1 – 1.5 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน ใบ : สีเขียว ดอก: สีขาว ม่วง ชมพู กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : แทบทุกชนิด ความชื้น : ปานกลาง - ต่ำ แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง หนอนชอนใบ อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 16/m² (6") ห่าง ต้นเดี่ยว 12/m² (6") **การใช้งาน:** ▪ ปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ มีดอกสีสดใส ▪ นิยมปลูกในสวนสาธารณะ รีสอร์ท เพราะเลี้ยงง่าย ออกดอกสวยงามตลอดปี ▪ ทำรั้วได้ ถ้าควบคุมทรงพุ่มให้เตี้ยจะไม่มีดอก ไม้ริมทะเล ริมถนน

12. ชบาจิ๋ว

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : MALVACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus hirtus L.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 1 – 5 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.5 – 0.6 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน ใบ : สีเขียว ดอก: สีชมพูอมส้ม ดอกบานเพียงวันเดียว กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ทั่วไป ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน - ร่ำไร โรค/แมลง : หนอนกัดกินใบและเพลี้ยแป้ง อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 16/m² (10") ห่าง 12/m² (10") **การใช้งาน:** ▪ ปลูกเป็นพุ่มเดี่ยวหรือเหมาะปลูกเป็นแปลงเพราะเมล็ดร่วงเป็นต้นใหม่ทดแทนไปเรื่อยๆ ▪ เหมาะที่จะปลูกริมรั้วหน้าบ้านที่มีพื้นที่ไม่กว้างนัก ▪ เป็นไม้กระถางได้ดี มีดอกตลอดปี

13. ชบาด่าง 3 สี

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : MALVACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus rosa – sinensis L. 'Matensis'

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : ไข่ ความสูง : 1 – 2 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 1 – 1.5 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : สีน้ำตาลดำ ใบ : สีเขียวมีสีขาว และชมพูประปราย ขอบใบหยัก ดอก: สีแดงสด กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ทุกชนิด ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : หนอนกินใบ เพลี้ยอ่อนบริเวณคอดอก เพลี้ยแป้ง อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 16/m² (6") ห่าง ต้นเดี่ยว 12/m² (6").

การใช้งาน:
- ปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ และตัดแต่งทรงพุ่มตามต้องการ ใช้ทำรั้ว
- สีใบสวยงาม นิยมปลูกมากกว่าชบาชนิดอื่น ไม้ริมทะเล ริมถนน
- ในกลุ่มชบาทั้งหมด ชบาด่าง 3 สี จะมีแมลงหรือเพลี้ยรบกวนน้อยที่สุด การป้องกันให้ได้ผลคือ ใช้ยากำจัดปลวกพ่นที่ดินใกล้โคนต้น จะช่วยกำจัดมดที่เป็นพาหะของเพลี้ยได้

14. ชวนชม

ชื่อสามัญ : Desert rose, Mock azalea, Impala lily
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่เตี้ย ความสูง : 1 – 2 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 1 – 2 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อนเกือบขาวอวบน้ำ มีน้ำยางสีขาวขุ่นเป็นพิเศษ ใบ : สีเขียวเข้ม เป็นมัน ดอก: สีชมพูสด กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ระบายน้ำดี ควรผสมทรายและอิฐมอญหัก ความชื้น : ต่ำ แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : หนอนกินใบ อัตราการเจริญเติบโต : ช้า ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 16/m² (6") ห่าง ต้นเดี่ยว 12/m² (6")

การใช้งาน:
- เหมาะกับสวนกรวด ปลูกบนระเบียง เพราะได้แดดจัด และไม่ต้องรดน้ำมาก
- นิยมปลูกในกระถาง ทนแล้งดีมากไม่ต้องรดน้ำได้นานถึง 1 เดือน หรือมากกว่านั้น
- ไม้ริมทะเล ริมถนน ระวังยางมีพิษ

15. ช้องนาง

ชื่อสามัญ : Bush clock vine, King's mantle
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thunbergia erecta (Benth.) Anderson

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 1.5 - 2.5 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 1 - 2 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : สีน้ำตาล ใบ : สีเขียวด้าน ดอก: สีม่วง เกสรสีเหลือง ขาว กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ร่วนผสมใบไม้ผุ ความชื้น : ปานกลาง - สูง แสง : แดดเต็มวัน - รำไร โรค/แมลง : - อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 16/m² (6") ห่าง ต้นเดี่ยว 12/m² (6")

การใช้งาน:
- ควรปล่อยทรงพุ่มอิสระ ตัดแต่งบ้างแต่ไม่ควรต่ำกว่า 1 เมตร จะได้ทั้งดอกและทรงพุ่มสวยงาม
- ต้นช้องนางมีดอกสีขาวด้วย

16. ชาฮกเกี้ยน

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : BORAGINACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carmona retusa (Vahl) Masam.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : ห้อยลง ความสูง : 0.3 – 3 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 – 2.0 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน ใบ : สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก: สีขาว กลิ่น : -	ช่วงการมีดอก : หมุนเวียนตลอดปี ดิน : ร่วน ความชื้น : ปานกลาง - ต่ำ แสง : แดดเต็มวัน - ปานกลาง โรค/แมลง : เชื้อรา อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m² (bag) ห่าง 25/m² (bag)

การใช้งาน:
- ตัดแต่งเป็นรูปต่างๆ ได้ตามต้องการ จึงนิยมทำเป็นไม้ดัด และบอนไซ
- ปลูกเป็นแปลงใหญ่ในสวนหย่อม เพื่อให้มีสีเขียวเข้มตัดกับไม้ดอกอื่นๆ
- ทำรั้วบ้านได้ดีเท่ากับข่อย เพราะไม่ทิ้งใบที่โคนต้น
- ทำเป็นไม้ขอบแปลงในสวนประดิษฐ์ ขนาดตั้งแต่ 0.15 – 2 เมตร ได้
- ไม้ริมทะเล ทนน้ำท่วมขังแฉะ

17. เทียนทอง

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Duranta erecta L.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : ไข่ ความสูง : 2 - 3 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 - 1 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน ใบ : สีเหลืองทอง ดอก: สีม่วง กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : แทบทุกชนิด ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : หนอนไชกิ่งและราก อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m² (bag) ห่าง ต้นเดี่ยว 25/m² (bag)

การใช้งาน:
- ปลูกเป็นกลุ่มทำไม้ขอบแปลง
- นิยมใช้จัดสวนเพราะมีสีสดใส ใช้สีเหลืองของใบตัดกับไม้สีเขียวแดงหรือสีเขียวเข้ม
- ตัดแต่งเป็นไม้ดัดหรือทำรั้วได้
- ไม้ริมทะเล ริมถนน

18. เทียนหยดแคระ

ชื่อสามัญ : Golden dew drop, Pigeon berry
ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Duranta erecta L.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่เตี้ย ความสูง : 1 – 6 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 – 0.5 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน ใบ : สีเขียวอ่อน ดอก: สีม่วง กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : แทบทุกชนิด ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : ขอบใบแห้ง อัตราการเจริญเติบโต : ช้า ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m² (bag) ห่าง ต้นเดี่ยว 25/m² (bag)

การใช้งาน:
- ปลูกเป็นไม้ขอบแปลง สูงประมาณ 30 – 40 ซม.
- ไม้ริมทะเล ริมถนน
- อาจปลูกร่วมกับเทียนหยดด่างหรือเทียนทองได้
- ดอกสีม่วง ชอบแดดจัด การระบายน้ำดีและตัดแต่งทรงพุ่มได้

19. เทียนหยดด่าง (ชาด่าง)

ชื่อสามัญ : Variegated golden dew drop
ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Duranta erecta L. 'Variegata'

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : ไข่ ความสูง : 1 – 3 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.6 – 1.5 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน ใบ : สีเขียวปนขาวอมเหลือง ดอก: สีขาว ม่วง กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ทั่วไป ความชื้น : สม่ำเสมอ แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : - อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m² (bag) ห่าง ต้นเดี่ยว 25/m² (bag) **การใช้งาน:** ▪ นิยมปลูกเป็นไม้ขอบแปลง โดยปลูกเป็นแปลงใหญ่ ตัดกับเข็มญี่ปุ่นหรือชาฮกเกี้ยน ทำรั้วได้ ▪ ปลูกเป็นพุ่มเตี้ยได้ เพราะพุ่มแน่นไม่ทิ้งใบมาก สีของใบมีสีเขียวอ่อนปนเหลือง จึงมองดูสว่างกว่าเข็ม ▪ ไม้ริมทะเล ริมถนน

20. บลูฮาวาย

ชื่อสามัญ : Brazillian snapdragon
ชื่อวงศ์ : SCROPHULARIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Otacanthus caeruleus Lindl.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : ไข่ ความสูง : 0.5 - 0.9 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 - 0.8 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีเขียว ใบ : สีเขียวเข้ม ดอก: สีม่วงปนน้ำเงิน กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : หมุนเวียนตลอดปี	ดิน : ร่วน ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : เชื้อรา อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m² (bag) ห่าง ต้นเดี่ยว 25/m² (bag) **การใช้งาน:** ▪ ปลูกเป็นกลุ่มใหญ่จะสวย ควรค้ำยันกิ่งหลังปลูกระยะหนึ่ง ▪ เลี้ยงง่าย ออกดอกตลอดปี ดอกสีม่วงครามสวยงาม จึงเป็นที่นิยมในการจัดสวนทั่วไป ▪ ตัดแต่งทรงพุ่มได้ แต่ไม่ควรต่ำกว่า 0.5 - 0.6 เมตร ถ้าตัดแต่งบ่อยเกินไปจะไม่มีดอก กิ่งเปราะหักง่าย

21. บานเช้าสีเหลือง (บานเช้าต้น)

ชื่อสามัญ : West Indian holly, Sage rose
ชื่อวงศ์ : TURNERACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Turnera ulmifolia L.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 0.6 – 1.2 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 – 0.6 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : สีน้ำตาล ใบ : สีเขียวเข้ม ดอก: สีเหลือง กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ร่วนซุย ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : เพลี้ยแป้ง ไรแดง อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 25/m² (6") ห่าง 16/m² (6") **การใช้งาน:** ▪ ปลูกเป็นกลุ่มใหญ่ ข้างทางเดิน ในพื้นที่ขนาดใหญ่ ในบริเวณที่ดูแลรักษาต่ำแต่ต้องการดอกตลอดปี ▪ ทนแล้งได้ดี แต่ไม่ทนน้ำขังแฉะ ▪ ขยายพันธุ์ได้ยาก นิยมเก็บต้นกล้าที่งอกโคนต้นเดิมไปใช้

22. บานบุรีแคระ

ชื่อสามัญ : Common allamanda, Golden trumpet
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Allamanda cathartica L.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 0.4 – 3 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 – 1 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน ใบ : สีเขียวเทา ดอก: สีเหลือง กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : หมุนเวียนตลอดปี	ดิน : ทนดินเค็มได้ดี ความชื้น : ปานกลาง - ต่ำ แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : - อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 25/m² (6") ห่าง 16/m² (6") **การใช้งาน:** ▪ ปลูกเป็นแปลงไม้ดอกธรรมชาติหรือในสวนหย่อมเพราะขนาดไม่ใหญ่มากและตัดแต่งได้ ▪ ถ้าการระบายน้ำไม่ดีใบจะร่วง ทำให้พุ่มโปร่งไม่สวยงาม ▪ ปลูกทางภาคใต้หรืออยู่ริมทะเลจะสวยมาก ยางจากต้นมีพิษ

23. บานไม่รู้โรยฝรั่ง

ชื่อสามัญ : Dentata ruby
ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alternanthera dentata (Moench) Scheygr

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 1 - 2 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 - 0.6 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีแดงเข้ม - ม่วง ใบ : สีแดงเข้ม ดอก: สีขาว กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : หมุนเวียนตลอดปี	ดิน : แทบทุกชนิดยกเว้นดินเหนียว ความชื้น : ปานกลาง - ต่ำ แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : - อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 25/m² (bag) ห่าง 16/m² (bag) **การใช้งาน:** ▪ ใบสีแดง ดอกสีขาว ทำให้ดูเด่นมากเมื่อปลูกเป็นแปลงใหญ่ ริมทางเดิน หรือเป็นฉากหลังริมกำแพง ▪ ไม่ควรตัดพุ่มให้ต่ำกว่า 1 เมตร เพราะจะไม่สวยงาม ▪ ดูแลรักษาง่าย ไม้ริมทะเล ▪ ควรเล่นสีตัดกับต้นไม้สีเขียวหรือสีทอง

24. ใบเงิน; ใบทอง; ใบนาก 1

ชื่อสามัญ : Caricature plant
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Graptophyllum pictum (L.) Griff

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : ไข่ ความสูง : 1 – 2 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.5 – 0.8 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน ใบ : เขียวด่างขาว เหลือง ตรงกลางใบ; เหลืองทอง เขียวขอบเหลือง; สีเขียวด่าง ชมพูตรงกลางใบ ดอก: สีแดง กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : หมุนเวียนตลอดปี	ดิน : ทุกชนิด ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน - ครึ่งวัน โรค/แมลง : หนอนกินใบ เพลี้ยหอย อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m² (bag) ห่าง 25/m² (bag) **การใช้งาน:** ▪ เป็นไม้มงคลจึงเป็นที่นิยมตามบ้านต่างๆ ▪ ไม่ควรใช้ในสวนหย่อมเพราะโตเร็วเกินไป ▪ ปลูกประดับถนน ทำเป็นแนวรั้วที่ไม่จำกัดความสูง ไม้ริมทะเล ▪ ถ้าตัดแต่งเตี้ยเกินไป พุ่มใบจะโปร่ง ควรให้พุ่มสูงไม่ต่ำกว่า 0.6 เมตร ▪ เมื่อต้นมีขนาดใหญ่มากจะไม่สวย ควรตัดกิ่งไปปักชำแล้วปลูกใหม่

25. ใบเงิน; ใบทอง; ใบนาก 2

ชื่อสามัญ : Caricature plant
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pseuderanthemum atropurpureum L.H.Bail

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : ไข่ ความสูง : 1 – 2 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.5 – 0.8 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน ใบ : เขียวมีแถบเขียวอ่อนและขาวอยู่ริมใบ; เหลืองปนจุดประสีเขียว; ม่วงแดงขอบใบเป็นสีชมพู ดอก: สีขาว ชมพู กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : หมุนเวียนตลอดปี	ดิน : ทุกชนิด ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน - ครึ่งวัน โรค/แมลง : หนอนกินใบ เพลี้ยหอย อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m² (bag) ห่าง 25/m² (bag) **การใช้งาน:** ▪ กลีบดอกแผ่กางเห็นชัดเจนมากกว่าดอกของใบเงิน; ใบทอง; ใบนาก1 หรือกลุ่มแรก (Graptophyllum pictum) ▪ การใช้งานเหมือนใบเงิน; ใบทอง; ใบนาก1

26. ประทัดจีน (ประทัดแตก)

ชื่อสามัญ : Bitter wood, Coral plant, Firecracker plant, Fountain plant
ชื่อวงศ์ : SCROPHULARIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่เตี้ย ความสูง : 1 - 2 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.5 - 1 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีน้ำตาลเทา ใบ : เป็นเส้นฝอยสีเขียวสด ดอก: สีแดงสด ส้ม รูปร่างเหมือนประทัด กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : พ.ย. – มี.ค.	ดิน : แทบทุกชนิด ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : เชื้อรา อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 16/m² (6") ห่าง ต้นเดี่ยว 12/m² (6") **การใช้งาน:** ▪ ทรงพุ่มแผ่เตี้ย ใบเป็นเส้นเหมาะกับสวนหินและริมน้ำตกที่ได้รับแสง ▪ เลี้ยงดูง่ายนิยมใช้จัดสวนมาก ไม้ริมทะเล

27. ประทัดไต้หวัน

ชื่อสามัญ : Scarlet bush, Firebush
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hamelia patens Jacq.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 3 – 7 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.5 – 1 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน ใบ : สีเขียวปนส้ม ดอก: สีแดงส้ม กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : เกือบทุกชนิด ระบายน้ำดี ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : รากเน่าและใบร่วง ถ้าน้ำท่วมขัง อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 16/m² (6") ห่าง ต้นเดี่ยว 12/m² (6") **การใช้งาน:** ▪ ปลูกเป็นกลุ่มใหญ่ใกล้กำแพง สีดอกจะตัดกับผนัง ▪ ตัดแต่งทรงพุ่มได้ แต่ไม่ควรต่ำกว่า 0.6 เมตร ▪ เจริญเติบโตเร็ว เลี้ยงดูง่าย

28. ปัตตาเวีย (ปัตตาเวียใบแฉก)

ชื่อสามัญ : Cotton – leaved jatropha, Peregrina, Spicy jatropha
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jatropha integerrima Jacq.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : ไข่ ความสูง : 1.5 – 6 ม ขนาดทรงพุ่ม : 0.7 – 2 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : สีน้ำตาลเข้ม ใบ : สีเขียวแก่ ดอก: สีแดง ชมพู กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ทุกชนิด น้ำไม่ขังแฉะ ความชื้น : สม่ำเสมอ แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : หนอนกัดกินใบ เพลี้ยอ่อนที่ดอก เพลี้ยแป้ง อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 25/m² (6") ห่าง 16/m² (6") **การใช้งาน:** ▪ ปลูกร่วมกับไม้ประดับอื่นๆ ในแปลง หรือปลูกต้นเดียว ▪ ควรปลูกเป็นแปลงที่อยู่ด้านในสุดของกลุ่มเพราะต้นสูง หรือปลูกริมทางเดินขนาดใหญ่เพื่อไม่ให้บังสายตา ไม้ริมทะเล ริมถนน ▪ เลี้ยงดูง่าย มีดอกตั้งแต่ต้นยังเล็ก ไม่ควรตัดแต่งให้ต่ำกว่า 1 เมตร

29. พกากรองต้น

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lantana spp.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม ความสูง : 0.6 – 2 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 1 – 1.9 ม. ผิวสัมผัส : ปานกลาง ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน ใบ : สีเขียวอ่อน ดอก: สีเหลือง แดง ชมพู ขาว ม่วง กลิ่น : หอมฉุน ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ร่วนซุยหรือดินปนทราย ความชื้น : ต่ำ แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : กิ่งแห้งตายปลายเข้าหาโคน อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 0.6 - 1 ม ห่าง ต้นเดี่ยว 1.5 - 2 ม **การใช้งาน:** ▪ ปลูกประดับเพื่อดูสีดอกที่หลากหลาย เป็นรั้ว เกาะกลางถนน หรือปลูกร่วมกับพืชอื่นๆ ▪ กิ่งอาจเกะกะต้องคอยตัดแต่งเสมอ ▪ ใบ ผล เป็นพิษ ไม้ริมทะเล ▪ นิยมนำมาเสียบกิ่งเป็นตอไม้ดัดหลากสี

30. พุทธรักษา

ชื่อสามัญ : Canna
ชื่อวงศ์ : CANNACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Canna hybrid

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แตกกอ ความสูง : ได้ถึง 1 – 2 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 – 0.8 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : ไม่มี ใบ : สีเขียว ลายเหลือง ลายแดง แดงเข้ม ดอก: สีแดง แสด เหลือง ชมพู กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ร่วน ความชื้น : สูง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : หนอนม้วนใบ อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 9/m² (8") ห่าง ต้นเดี่ยว 6/m² (8") **การใช้งาน:** ▪ ไม้ล้มลุกหลายฤดู มีเหง้าใต้ดิน ▪ ต้องการการดูแลรักษาสูงเรื่องการตัดแต่งใบไปทิ้ง มิฉะนั้นใบจะเหี่ยวคาต้น ทนน้ำท่วมขัง ▪ ระบบรากพุทธรักษาดูดซับน้ำเสียได้ดี

31. พวงทองต้น

ชื่อสามัญ : Galphimia, Gold shower
ชื่อวงศ์ : MALPIGHIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thryallis glauca Kuntze.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม	ดิน : แทบทุกชนิด
ความสูง : 0.5 - 1.2 ม.	ความชื้น : ปานกลาง
ขนาดทรงพุ่ม : 0.4 - 0.6 ม.	แสง : แดดเต็มวัน
ผิวสัมผัส : ละเอียด	โรค/แมลง : -
ลำต้น : สีน้ำตาลแดง	อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ใบ : เขียวอ่อน	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 16/m² (10")
ดอก: สีเหลืองสด	ห่าง ต้นเดี่ยว 12/m² (10")
กลิ่น : -	**การใช้งาน:**
ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	▪ ปลูกเป็นแปลงใหญ่ หรือเป็นแนวริมกำแพง
	▪ นิยมใช้จัดสวนแต่ไม่ควรตัดแต่งให้ต่ำกว่า 0.6 เมตร เพราะโคนต้นจะโล่งและไม่มีดอก
	▪ ถ้าน้ำขังแฉะใบจะร่วงง่าย ไม่ริมทะเล

32. เฟื่องฟ้า

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : NYCTAGINACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bougainvillea spp. and hybrid

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : -	ดิน : ทั่วไป ระบายน้ำดี
ความสูง : -	ความชื้น : ต่ำ
ขนาดทรงพุ่ม : เถาแข็งใหญ่	แสง : แดดเต็มวัน
ผิวสัมผัส : ละเอียด	โรค/แมลง : -
ลำต้น : สีน้ำตาล	อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ใบ : สีเขียว	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 15 ม. (6/ม²)
ดอก: สีแดง ขาว ชมพู บานเย็น	ห่าง 2.5 ม. (3/ม²)
ม่วงแดง	**การใช้งาน:**
กลิ่น : -	▪ ปลูกขึ้นซุ้ม แต่ซุ้มต้องแข็งแรงพอ เพราะมีขนาดใหญ่ และมีหนาม ไม่เหมาะในสนามเด็กเล่น
ช่วงการมีดอก : ตลอดทั้งปี	▪ ปลูกเป็นไม้กระถางดีมาก
	▪ ถ้าต้องการดอกเต็มต้น ต้องดูแลพุ่มใบให้สมบูรณ์ก่อน งดน้ำจนใบร่วงแล้วจึงให้น้ำและปุ๋ยสูตรเสมอ จะออกดอกพรูเต็มต้น

33. มะผู้มะเมีย (หมากผู้หมากเมีย)

ชื่อสามัญ : Good luck plant, Cordyline , Miracle plant
ชื่อวงศ์ : DRACAENACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cordyline fruticosa (L.) Copp.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แตกพุ่มที่ยอด	ดิน : ทั่วไป
ความสูง : 1.5 – 3 ม.	ความชื้น : สูง
ขนาดทรงพุ่ม : 1.5 – 2 ม.	แสง : ปานกลาง - ร่ำไร
ผิวสัมผัส : หยาบ	โรค/แมลง : เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง ใบจุดสนิม
ลำต้น : สีน้ำตาลเข้ม	อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ใบ : สีเหลืองเขียว เขียวแก่	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 16/m² (6")
เขียวอ่อน ชมพู แดง	ห่าง ต้นเดี่ยว 9/m² (6")
ดอก: สีชมพู ขาว	**การใช้งาน:**
กลิ่น : -	▪ ควรตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อให้แน่นขึ้น ถ้าตัดสูงไปควรตอนให้เตี้ยลง
ช่วงการมีดอก : ฤดูฝน	▪ สีแดงของใบทำให้สวนในร่มดูสดใสเด่นขึ้น
	▪ ไม่ริมทะเล

34. ลิ้นกระบือ

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Excoecaria cochinchinensis Lour.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม	ดิน : แทบทุกชนิด
ความสูง : 1 - 1.5 ม.	ความชื้น : ปานกลาง - สูง
ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 - 0.8 ม.	แสง : แดดเต็มวัน - ร่ำไร
ผิวสัมผัส : หยาบ	โรค/แมลง : ใบหงิกงอเพราะแมลง
ลำต้น : สีน้ำตาลเข้ม	อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
ใบ : หลังใบสีเขียวเข้ม ท้องใบสีแดง	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m² (bag) ห่าง 25/m² (bag)
ดอก: สีเขียว	**การใช้งาน:**
กลิ่น : -	▪ เป็นไม้กระถางหรือประดับแปลง บังกำแพงหรือรั้ว
ช่วงการมีดอก : -	▪ ไม่นิยมปลูกในสวนหย่อมใกล้บ้านเพราะมีขนาดใหญ่ ตัดแต่งได้แต่ต้นควรสูงไม่ต่ำกว่า 0.5 เมตร
	▪ ปรับตัวเข้ากับสภาพแสงได้ดี ทั้งแดดจัดและร่ำไร
	▪ เลี้ยงดูง่ายและใบมีสีสวย
	▪ ไม้ริมทะเล ริมถนน ทนน้ำท่วมขัง

35. เล็บครุฑ

ชื่อสามัญ : Polyscias
ชื่อวงศ์ : ARALIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyscias spp.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม	ดิน : ระบายน้ำดี
ความสูง : 0.5 – 1 ม.	ความชื้น : ปานกลาง
ขนาดทรงพุ่ม : 1 – 1.5 ม.	แสง : แดดเต็มวัน - ร่ำไร
ผิวสัมผัส : หยาบ - ละเอียด	โรค/แมลง : เพลี้ยแป้ง
ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน มีจุดสีเข้มประทั่วไป	อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ใบ : ใบด่างลายเขียวอ่อน - แก่	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m² (bag)
ดอก: สีขาว ขนาดเล็ก	ห่าง ต้นเดี่ยว 25/m² (bag)
กลิ่น : -	**การใช้งาน:**
ช่วงการมีดอก : -	▪ ปลูกเป็นแปลงใหญ่ริมกำแพง จะบังกำแพงบางส่วนได้ดี
	▪ ปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแสงที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการผลัดใบของต้นไม้ใหญ่ได้
	▪ นิยมใช้เป็นไม้ประดับในอาคาร
	▪ ไม้ริมทะเล ริมถนน

36. แสยก

ชื่อสามัญ : Jew – bush, Redbird cactus
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม	ดิน : แทบทุกชนิด
ความสูง : 1 – 3 ม.	ความชื้น : ปานกลาง - สูง
ขนาดทรงพุ่ม : 0.5 – 1 ม.	แสง : แดดเต็มวัน
ผิวสัมผัส : หยาบ	โรค/แมลง : เพลี้ยแป้ง
ลำต้น : สีเขียว มียางสีขาว	อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
ใบ : สีเขียวด่าง เขียวอ่อน หรือ	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 25/m² (6") ห่าง 16/m² (6")
ด่างเหลือง ขาวและชมพู	**การใช้งาน:**
ดอก: สีแดง ออกที่ปลายกิ่ง	▪ ปลูกใกล้กำแพงหรือด้านข้างของอาคารที่ไม่มีความสำคัญนัก เพราะเป็นต้นไม้เลี้ยงง่าย ราคาไม่แพง
กลิ่น : -	▪ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแสงที่เปลี่ยนแปลงได้ดีพอสมควร
ช่วงการมีดอก : ม.ค. – ก.พ.	คล้ายขาไก่ด่าง
	▪ ทำเป็นรั้วเตี้ยได้ ไม่ริมทะเล

37. หนวดปลาหมึกแคระ

ชื่อสามัญ : Miniature umbrella plant, Hawaiian elf
ชื่อวงศ์ : ARALIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schefflera arboricola (Hayata) Hayata 'Compacta'

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม	ดิน : ทั่วไป
ความสูง : 1 – 2 ม.	ความชื้น : ปานกลาง
ขนาดทรงพุ่ม : 0.6 – 1.5 ม.	แสง : ปานกลาง - รำไร
ผิวสัมผัส : หยาบ	โรค/แมลง : เพลี้ยอ่อน
ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน	อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ใบ : สีเขียวเป็นมัน	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 16/m² (6") ห่าง 12/m² (6")
ดอก: -	**การใช้งาน:**
กลิ่น : -	▪ นิยมปลูกในพื้นที่ที่มีแสงปานกลาง เพราะเลี้ยงง่าย
ช่วงการมีดอก : -	▪ ตัดแต่งได้และมีทรงพุ่มสวยงาม
	▪ ใช้เป็นไม้ประดับในอาคารได้ดี
	▪ ปลูกริมถนนหรือริมทางเดินได้

38. หีบไม้งาม

ชื่อสามัญ : Boxwood beauty
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carissa grandiflora (E.Mey.) A.DC. "Boxwood Beauty"

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่เตี้ย	ดิน : ร่วน
ความสูง : 0.3 – 1.5 ม.	ความชื้น : ปานกลาง
ขนาดทรงพุ่ม : 0.5 – 1 ม.	แสง : แดดเต็มวัน - รำไร
ผิวสัมผัส : หยาบ	โรค/แมลง : เพลี้ยแป้ง
ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน	อัตราการเจริญเติบโต : ช้า
ใบ : สีเขียวเข้มเป็นมัน หนา แข็ง และมีหนามสั้นๆ ที่ปลายใบ	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 9/m² (10") ห่าง ต้นเดี่ยว 6/m² (10")
ดอก: สีขาว	**การใช้งาน:**
กลิ่น : หอม	▪ ควรใช้ในสวนหย่อมเพราะโตช้า ตัดแต่งทรงพุ่มหรือทำเป็นรั้วเตี้ยได้
ช่วงการมีดอก : หมุนเวียนตลอดปี	▪ ทรงพุ่มแน่น สีใบเขียวเป็นมันสวยงาม ชอบอากาศเย็น

39. เอื้องทอง (กนกลายไทย)

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sanchezia speciosa Leonard

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : กลม	ดิน : ร่วน
ความสูง : 1 – 2 ม.	ความชื้น : ปานกลาง - สูง
ขนาดทรงพุ่ม : 0.5 – 1.5 ม.	แสง : แดดเต็มวัน - ครึ่งวัน
ผิวสัมผัส : หยาบ	โรค/แมลง : หนอนผีเสื้อกัดกินใบ เพลี้ยแป้ง
ลำต้น : กิ่งหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยม	อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
ใบ : สีเขียว เส้นขอบใบ และลายกลางใบเป็นสีเหลือง	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m². (bag) ห่าง 25/m². (bag)
ดอก: สีส้มเหลือง ออกปลายกิ่ง	**การใช้งาน:**
กลิ่น : -	▪ ควรปลูกในบริเวณที่ไม่จำกัดความสูงและขนาดของแปลง เช่น ริมทางเดินในที่กว้างๆ หน้ากำแพง เป็นฉากหลังของศาลาไม้ริมทะเล
ช่วงการมีดอก : หมุนเวียนตลอดปี	▪ โตเร็ว ไม่เหมาะกับสวนหย่อมด้านหน้าอาคาร ควรระวังเรื่องความสูงของพุ่ม เพราะอาจบังสายตาได้
	▪ เหมาะกับรีสอร์ทหรือสวนสาธารณะ เพราะมีสีสดใส เลี้ยงง่าย โตเร็วและขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วย

ไม้พุ่มเตี้ย (ไม้ระดับต่ำ-ใหญ่)
Low Plants-Large

ไม้พุ่มเตี้ย (ไม้ระดับต่ำ-เล็ก)
Low Plants- Small

1. กาบหอยแครง; กาบหอยแครงแคระ

ชื่อสามัญ : Boat lily, Oyster plant
ชื่อวงศ์ : COMMELINACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tradescantia spathacea Sw.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แตกกอตั้งตรง ความสูง : 0.15 - 0.5 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.2 - 0.40 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : สีม่วงเข้ม ใบ : สีม่วงปนเขียว ท้องใบสีม่วง ดอก: สีขาว กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : หมุนเวียนตลอดปี	ดิน : ทั่วไป ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดครึ่งวัน - แดดน้อย โรค/แมลง : ขอบใบไหม้ อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 25/ม.^{2} 30/ม^2 (ถุง) ห่าง 16/ม^2 (ถุง) **การใช้งาน:** ▪ ใช้คลุมดินในกลุ่มอากาเว่ จันทร์ผา เข็มกุดั่น ไม่ควรใช้ร่วมกับกลุ่มต้นไม้ที่มีใบอ่อนพริ้ว เช่น หมากเหลือง หลิว เป็นต้น ▪ ทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี ใช้ริมถนน ริมทะเล

2. การะเกดหนู

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : PANDANACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus pygmaeus Thouars

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แตกกอกลม ความสูง : 0.3 - 0.6 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 - 0.5 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : ไม่มีลำต้น ใบ : สีเขียวปนเหลือง ขอบใบมีหนาม ดอก: สีครีม	กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : เมื่อต้นสมบูรณ์ ดิน : ร่วนปนทราย ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดครึ่งวัน โรค/แมลง : โคนต้นเน่าเมื่อน้ำขัง อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 25/m^2 (10") ห่าง 16/m^2 (bag)

การใช้งาน:
- ใบลักษณะเป็นเส้นห้อยย้อยลง เหมาะใช้ร่วมกับไม้ประธานที่ใบมีลักษณะคล้ายกัน หรือจะปลูกร่วมกับไม้พุ่มตัดแต่งกลม เช่น เข็มเหลืองหรือชาฮกเกี้ยน เพื่อสร้างความแตกต่างกัน
- เป็นไม้คลุมดินที่มีหนาม เหมาะใช้ในพื้นที่ที่มีการรบกวนจากสัตว์เลี้ยงต่างๆ ปลูกคลุมดินในสวนหย่อมและทั่วไป ไม่เหมาะในสนามเด็กเล่น ไม้ริมทะเล ริมถนน
- ตำแหน่งที่ปลูกควรอยู่บนเนินเล็กน้อย ชอบการระบายน้ำดีทนแล้ง

3. กำแพงเงิน

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : LILIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dianella ensifolia (L.) DC.f. straminea (Yatabe) Kitamura

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แตกกอกลม ความสูง : 0.3 - 0.5 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 - 0.5 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : ไม่มีลำต้น ใบ : สีเขียวสลับขาวเป็นทางยาว ดอก: สีขาว กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : หมุนเวียนตลอดปี	ดิน : แทบทุกชนิด ความชื้น : สูง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : หนอนกัดกินใบ ใบจุดสนิม อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 25/m^2 (bag) ห่าง 16/m^2 (bag) **การใช้งาน:** ▪ ใช้ลักษณะเดียวกับว่านสี่ทิศด่าง แต่ราคาถูกกว่า ▪ นิยมปลูกร่วมกับจันทน์ผาและจุดอื่นๆ ที่ต้องการลักษณะใบเป็นเส้น ▪ ควรตัดดอกทิ้ง เพราะดูรกเหมือนวัชพืช ▪ ปลูกริมถนนและริมทะเลได้

4. ซุ้มกระต่ายเขียว

ชื่อสามัญ : White lily turf
ชื่อวงศ์ : LILIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ophiopogon jaburan (Kunth) Lodd.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แตกกอกลม ความสูง : 0.3 - 0.6 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.4 - 0.5 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีเขียวเข้ม ใบ : สีเขียวเข้ม ดอก: สีขาว กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ฤดูร้อน	ดิน : ร่วน เหนียว ความชื้น : ปานกลาง - สูง แสง : ร่มรำไร โรค/แมลง : - อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 25/m^2 (bag) ห่าง 16/m^2 (bag) **การใช้งาน:** ▪ ปลูกตามซอกหินข้างน้ำตกที่มีร่มรำไร ▪ ปลูกเป็นแปลงในสวนที่ได้รับแสงน้อยประมาณ 30-40 % ▪ นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง ▪ เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์ด้วยการแตกกอ

5. ผักโขมแดง

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aerva sanguinolenta (L.) Blume

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : ไข่ ความสูง : 0.15 - 0.5 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.15 - 0.30 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีแดง ใบ : สีแดง ดอก: สีเหลือง กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ร่วน ทั่วไป ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : ใบเน่าถ้าน้ำขัง เพลี้ยแป้ง อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 45/m^2 (bag) ห่าง 35/m^2 (bag) **การใช้งาน:** ▪ แผ่ปกคลุมพื้นที่เร็ว สามารถตัดแต่งได้ ▪ นิยมใช้ในสวนหย่อมมากเพราะมีสีแดงสด ใช้เป็นจุดเด่น ▪ ปลูกใกล้กับเกล็ดแก้วหรือชาฮกเกี้ยนเพื่อให้สีตัดกัน

6. ไผ่ฟิลิปปินส์ด่าง

ชื่อสามัญ : Gold - dust dracaena; Florida beauty
ชื่อวงศ์ : DRACAENACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena surculosa Lindl. 'Florida Beauty'; 'Friedmannii'

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่เตี้ย ความสูง : 0.5 - 1 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 - 0.6 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : สีน้ำตาล ใบ : สีเขียวเข้ม มีจุดสีเขียวอมเหลืองกระจายทั่วไป ดอก: สีขาวนวล กลิ่น : หอม ช่วงการมีดอก : เมื่อต้นสมบูรณ์	ดิน : ร่วน ระบายน้ำได้ดี ความชื้น : ปานกลาง-สูง-สม่ำเสมอ แสง : แดดรำไร โรค/แมลง : ใบจุดสนิม อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m^2 (6") ห่าง 25/m^2 (6") **การใช้งาน:** ▪ ปลูกคลุมดินในพื้นที่ที่มีแสงน้อยประมาณ 30-40% ▪ สีใบสว่างสดใส มีทั้งด่างเหลืองและขาว ▪ ใช้เป็นไม้กระถางแขวนหรือประดับบนโต๊ะได้

7. พลับพลึงหนู

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : AMARYLLIDACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hymenocallis spp.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แตกกอกลม	ดิน : ร่วน
ความสูง : 0.3 - 0.6 ม.	ความชื้น : ปานกลาง
ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 - 0.5 ม.	แสง : แดดเต็มวัน - ครึ่งวัน
ผิวสัมผัส : ละเอียด	โรค/แมลง : หนอนผีเสื้อ และหอยทากกินใบ
ลำต้น : ไม้หัว	อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ใบ : สีเขียวเข้มใบยาวเรียว	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/ม^2(bag)
ดอก: สีขาว	ห่าง 25/ม^2(bag)
กลิ่น : หอม	
ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	

การใช้งาน:
- ปลูกคลุมดินเป็นกลุ่ม ใบเป็นเส้นห้อยย้อยลง ตัดกับไม้ที่ตัดแต่งเป็นพุ่มกลม เช่น ชาฮกเกี้ยน
- ใบยาวละเอียด ดูอ่อนหวานกว่าพลับพลึงตีนเป็ด เลี้ยงง่าย ปลูกริมถนนและริมทะเลได้
- ทนน้ำท่วมขัง

8. แพงพวยฝรั่ง

ชื่อสามัญ : Rose periwinkle, Madagascar periwinkle
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Catharanthus roseus (L.) G.Don

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : ไข่	กลิ่น : -
ความสูง : 0.3 - 0.8 ม.	ช่วงการมีดอก : ตลอดปี
ขนาดทรงพุ่ม : 0.5 - 0.8 ม.	ดิน : ทรายหรือดินเค็ม ไม่ชอบดินเปรี้ยว
ผิวสัมผัส : ละเอียด	ความชื้น : ปานกลาง ทนแล้งดีมาก
ลำต้น : สีน้ำตาลแดง	แสง : แดดเต็มวัน
ใบ : สีเขียวเป็นมัน เส้นกลางใบสีขาว	โรค/แมลง : โคนเน่า
ดอก: สีขาว ชมพู	อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 25/m^2 (bag)
	ห่าง 16/m^2 (bag)

การใช้งาน:
- เหมาะปลูกบนเนิน น้ำไม่ท่วมขังและอากาศถ่ายเทดี
- พันธุ์พื้นเมืองจะดูแลรักษาง่ายกว่าพันธุ์จากต่างประเทศ
- ดอกสีขาวจะดูเด่นกว่าดอกสีแดง
- เหมาะกับสวนไม้ดอกแบบธรรมชาติที่ดูแลรักษาง่าย
- ทนแล้งดีมาก ใช้ในบริเวณที่ไม่สามารถรดน้ำได้บ่อยนัก
- ไม้ริมทะเลและไม้ดอกกระถางประดับในอาคารได้ 7 วัน

9. ฤาษีผสม

ชื่อสามัญ : Coleus, Painted nettle
ชื่อวงศ์ : LABIATAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : ไข่	ช่วงการมีดอก : หมุนเวียนตลอดปี
ความสูง : 0.3 - 1 ม.	ดิน : ร่วนปนทรายที่เก็บความชื้นได้
ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 - 0.5 ม.	ความชื้น : สูง
ผิวสัมผัส : หยาบ	แสง : แดดเต็มวัน
ลำต้น : สีขาว	โรค/แมลง : โรคเน่าคอดินถ้ามีน้ำมาก หนอนกินใบ
ใบ : มีหลากสี เช่น เขียว แดง ลายด่าง	อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
ดอก: สีขาว ม่วงอ่อน	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 25/m^2 (bag)
กลิ่น : -	ห่าง 16/m^2 (bag)

การใช้งาน:
- คลุมพื้นที่ได้ดีนิยมปลูกเป็นแปลงใหญ่ในพื้นที่กว้าง แดดเต็มวัน
- เลี้ยงง่าย อากาศเย็นสีจะสวยมาก
- เหมาะกับรีสอร์ทหรือสวนขนาดใหญ่ เพราะสามารถขยายพันธุ์เองได้
- ไม่เหมาะใช้ในบ้านเพราะอายุสั้น

10. ว่านสี่ทิศด่าง (รางทอง)

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : AMARYLLIDACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. 'Variegata'

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แตกกอเป็นแผง	ดิน : ร่วน - ปนทราย
ความสูง : 0.3 - 0.6 ม.	ความชื้น : ปานกลาง - สูง
ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 - 0.5 ม.	แสง : แดดเต็มวัน
ผิวสัมผัส : หยาบ	โรค/แมลง : ราสนิม หอยทาก
ลำต้น : ไม่มีลำต้น	อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ใบ : สีเหลืองสลับเขียว	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 25/m^2 (10")
ดอก: สีขาว	ห่าง 16/m^2 (10")
กลิ่น : หอมอ่อนๆ	
ช่วงการมีดอก : หมุนเวียนตลอดปี	

การใช้งาน:
- นิยมใช้จัดสวนหย่อมร่วมกับหินได้
- เน้นการตัดกับเส้นใบที่อ่อนช้อยและไม้ตัดแต่งพุ่มกลม เวลาปลูกควรสลับทางใบให้ประสานกัน ไม้ริมทะเล
- ถ้าเป็นราสนิมควรตัดใบทิ้งให้หมด รอให้แตกใบใหม่

11. เศรษฐีไซ่ง่อน (ซุ้มกระต่ายด่าง)

ชื่อสามัญ : Variegated lily turf
ชื่อวงศ์ : LILIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ophiopogon jaburan (Kunth) Lodd.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แตกกอกลม	ดิน : แทบทุกชนิด
ความสูง : 0.3 - 0.5 ม.	ความชื้น : ปานกลาง
ขนาดทรงพุ่ม : 0.2 - 0.3 ม.	แสง : แดดเช้า - เต็มวัน
ผิวสัมผัส : ละเอียด	โรค/แมลง : ราสนิม
ลำต้น : สีขาวปนเขียว	อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ใบ : สีเขียวและขาว	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 25/m^2 (bag)
ดอก: สีขาวเป็นมัน	ห่าง 16/m^2 (bag)
กลิ่น : -	
ช่วงการมีดอก : ฤดูร้อน	

การใช้งาน:
- คลุมดินประดับแปลงสวนหย่อม เลี้ยงง่าย
- นิยมใช้ร่วมกับต้นไม้ที่มีลักษณะใบคล้ายกัน เช่น จันทร์ผา เข็มสามสี ว่านสี่ทิศด่าง ซุ่มกระต่ายเขียว หนวดปลาดุก
- ปลูกเป็นไม้กระถางแขวนได้ มีต้นเล็กๆ งอกออกมาแยกไปปลูกได้
- ไม้ริมทะเล

12. หลิวไต้หวัน

ชื่อสามัญ : False heather, Elfin herb
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cuphea hyssopifolia HBK.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่เตี้ย	ดิน : ร่วน ทราย
ความสูง : 0.3 - 0.8 ม.	ความชื้น : ปานกลาง
ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 - 0.5 ม.	แสง : แดดเต็มวัน
ผิวสัมผัส : ละเอียด	โรค/แมลง : หนอนกัดกินใบและต้น ใบหงิกงอเนื่องจากเชื้อรา
ลำต้น : สีน้ำตาล	อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
ใบ : สีเขียวเป็นมัน	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 25/m^2 (bag)
ดอก: สีม่วงสดและขาว	ห่าง 16/m^2 (bag)
กลิ่น : -	
ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	

การใช้งาน:
- ปลูกคลุมดินแปลงหน้าสุดของสวนหย่อมหรือซอกหินริมธารน้ำ
- ชอบอากาศเย็น ทนน้ำแข็งเกาะในเขตหนาวได้ เช่น ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง
- ตัดแต่งและให้ปุ๋ยสม่ำเสมอจะทำให้ต้นแตกใบและมีดอก
- ปลูกริมถนนได้

1. กระดุมทองเลื้อย

ชื่อสามัญ : Climbing wedelia, Singapore daisy
ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wedelia trilobata (L.) Hitchc.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่เลื้อย ความสูง : 0.15 – 0.30 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.2 – 0.25 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : สีเขียว ใบ : สีเขียวเข้ม ดอก: สีเหลือง กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ทุกชนิด ความชื้น : ปานกลาง - สูง แสง : แดดเต็มวัน – ร่มรำไรได้ แต่จะไม่ค่อยมีดอก โรค/แมลง : หนอนกัดกินใบเล็กน้อย อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 16-20/ม^2 (6") ห่าง 12/ม^2 (6") **การใช้งาน:** ▪ ใช้คลุมดินที่ลาดเอียง คลุมดินดีมาก โตเร็วกว่าวัชพืช ▪ ปลูกแทนหญ้าบนเกาะกลางถนน ▪ เหมาะปลูกในที่สาธารณะที่ไม่มีการเดินผ่าน ▪ ไม่ควรใช้ในสวนหย่อมในบ้านเพราะโตเร็วมาก อาจรุกล้ำแปลงอื่น ▪ ออกดอกมากถ้าดินมีไนโตรเจนน้อย ▪ ไม้ริมทะเล

2. ก้ามปูหลุด

ชื่อสามัญ : Wandering jew
ชื่อวงศ์ : COMMELINACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tradescantia zebrina Loudon

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่เลื้อย ความสูง : 0.15 – 0.30 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.2 – 0.25 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : สีม่วง ใบ : สีเขียวด่างขาวม่วง ดอก: สีม่วงอมชมพู กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : -	ดิน : ทั่วไป ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน – ร่มรำไร โรค/แมลง : เพลี้ยแป้งและมด อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/ม^2 (bag) ห่าง 25/ม^2 (bag) **การใช้งาน:** ▪ คลุมพื้นที่ได้เร็ว แต่สีไม่สดใสเท่าใดนัก ▪ ใช้เป็นไม้กระถางแขวนดี ▪ ขยายพันธุ์ง่าย ▪ เหมาะกับพื้นที่ที่มีการดูแลรักษาต่ำ ปลูกริมถนน ▪ ไม้ริมทะเล

3. เกล็ดแก้ว

ชื่อสามัญ : Calico plant
ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alternanthera tenella Colla

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่เลื้อย ความสูง : 0.1 – 0.2 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.1 – 2 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีขาว - เขียว ใบ : สีเขียวปนขาว - ครีม ดอก: สีขาว กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : เม.ย. – พ.ค.	ดิน : ร่วนระบายน้ำดี ความชื้น : ปานกลาง ไม่ชอบน้ำขังแฉะ แสง : แดดเต็มวัน โรค/แมลง : มีน้อย ดูแลง่าย อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 40-50/ม^2 (ถุง) ห่าง 30/ม^2 (ถุง) **การใช้งาน:** ▪ นิยมใช้ในสวนหย่อมมาก ปลูกเป็นแปลงหน้าสุด ตัดให้มนเตี้ย ทั้งแปลงใช้เล่นสีตัดกับไม้คลุมดินสีแดงและเขียว ทำให้แปลงรวมดูสดใสขึ้น ▪ ไม่ชอบน้ำขังแฉะ

4. ดาดตะกั่ว

ชื่อสามัญ : Red ivy, Hemigraphis
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hemigraphis alternate (Burm.f.) T. Anderson

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่เลื้อย ความสูง : 0.1 – 0.15 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.2 – 0.3 ม. ผิวสัมผัส : หยาบ ลำต้น : สีม่วงเข้ม ใบ : ใบสีเขียวปนเงินเป็นมัน ท้องใบสีแดง ใบสากมือ ดอก: สีขาว กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	ดิน : ร่วน ความชื้น : สูงมาก แต่ไม่แฉะ แสง : แดดเต็มวัน ครึ่งวัน ร่มรำไร โรค/แมลง : หนอนกินใบ อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/ม^2 (bag) ห่าง 25/ม^2 (bag) **การใช้งาน:** ▪ เป็นไม้คลุมดินที่เหมาะกับสวนหย่อมแทบทุกแบบ ▪ ปลูกและดูแลรักษาง่าย ใช้ริมทางเดินในสวนได้ ▪ ปลูกเป็นไม้กระถางแขวน ▪ ชอบแดดครึ่งวันมากที่สุด ถ้าแดดเต็มวันพุ่มใบจะเล็กและเป็นสีตะกั่วมากขึ้น

5. บุษบาฮาวาย

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Asystasia gangetica (L.) T. Anderson 'Variegata'

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่เตี้ย ความสูง : 0.2 – 0.5 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.2 – 0.3 ม. ผิวสัมผัส : ละเอียด ลำต้น : สีเขียว ใบ : สีด่างขาวเขียวปนเหลืองเล็กน้อย ดอก: สีขาว กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : หมุนเวียนตลอดปี	ดิน : แทบทุกชนิด ความชื้น : ปานกลาง แสง : แดดเต็มวัน - แดดครึ่งวัน โรค/แมลง : หนอนกินใบ อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m^2 (bag) ห่าง 25/m^2 (bag) **การใช้งาน:** ▪ ปลูกเป็นขอบแปลงสวนหย่อมหรือเป็นแปลงด้านหน้าไม้พุ่มริมกำแพง ▪ เหมาะปลูกใกล้พรรณไม้ที่มีสีเขียวเข้มหรือแดง ▪ นิยมใช้ในการจัดสวนมาก ตัดแต่งทรงพุ่มได้ เลี้ยงง่าย ▪ ไม้ริมทะเล ริมถนน

6. ปีกแมลงสาบ

ชื่อสามัญ : Trailing watermelon begonia
ชื่อวงศ์ : URTICAEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elatostema repens (Lour.) Hallier f. & H. Schroet.; E. pulchrum Hallier f.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่เลื้อย ความสูง : 0.05 – 0.3 ม. ขนาดทรงพุ่ม : 0.05 – 0.2 ม. ผิวสัมผัส : ปานกลาง ลำต้น : สีเขียว ใบ : สีเขียวเทา ดอก: สีขาว กลิ่น : - ช่วงการมีดอก : -	ดิน : ร่วน ความชื้น : ปานกลาง แสง : ร่มรำไร โรค/แมลง : ถ้าแดดจัดขอบใบจะไหม้ ลำต้นเน่าถ้าดินแฉะเกินไป หอยทาก กินใบ อัตราการเจริญเติบโต : ช้า ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m^2 (bag) ห่าง 25/m^2 (bag) **การใช้งาน:** ▪ นิยมทำเป็นไม้แขวน ▪ ปลูกคลุมดินในแสงรำไร และแปลงปลูกยกสูงให้ใบปกคลุมลง ▪ ปลูกบนกระบะเหนือกำแพงให้ใบห้อยลง

7. พกากรองเลื้อย

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lantana spp.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่เลื้อย	กลิ่น : ฉุน
ความสูง : 0.3 – 0.5 ม.	ช่วงการมีดอก : ตลอดปี
ขนาดทรงพุ่ม : 0.2 – 0.3 ม.	ดิน : ร่วน
ผิวสัมผัส : ละเอียด	ความชื้น : ปานกลาง ไม่ชอบชื้นแฉะ
ลำต้น : สีน้ำตาล	แสง : แดดเต็มวัน
ใบ : สีเขียวสด	โรค/แมลง : ใบจุดสนิม เพลี้ยแป้ง ไรแดง
ดอก: สีเหลือง ม่วง ชมพู ขาว	อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m² (bag) ห่าง 25/m² (bag)

การใช้งาน:
- มีดอกหลายสี สีเหลือง สีชมพู มีพุ่มหนาแน่น นิยมปลูกคลุมดิน ไม้ริมทะเล ริมถนน
- ดอกสีม่วงใช้คลุมดินได้ดีมาก เลี้ยงง่ายกว่าแต่สีดอกไม่สดใสเท่าสีเหลืองหรือสีส้ม
- ต้องตัดแต่งทรงพุ่มและให้ปุ๋ยปีละหลายๆ ครั้ง จึงจะมีดอกงามตลอดปี
- เสียบยอดหลายสีกับตอผกากรองเลื้อยป่า เพื่อดัดเป็นพุ่มสวยงาม

8. ผักเป็ดเขียว; ผักเป็ดแดง

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alternanthera bettzickiana (Reg.) Nicholson

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่เลื้อย	ดิน : ร่วน ดินปนทราย
ความสูง : 0.1 – 0.2 ม.	ความชื้น : ปานกลาง
ขนาดทรงพุ่ม : 0.1 – 0.25 ม.	แสง : แดดเต็มวัน
ผิวสัมผัส : ละเอียด	โรค/แมลง : -
ลำต้น : มีทั้งสีเขียว และ สีแดง	อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
ใบ : มีทั้งสีเขียว และ สีแดง	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m² (bag) ห่าง 25/m² (bag)
ดอก: สีขาว	
กลิ่น : -	
ช่วงการมีดอก : -	

การใช้งาน:
- ควรปลูกเป็นขอบแปลงในสวนหย่อมที่ใกล้ลานนั่งเล่น หรือมีขนาดแปลงที่ไม่ใหญ่มากนัก จะดูแลง่าย
- ดูแลรักษาง่าย ต้องตัดแต่งทรงพุ่มจึงจะสวยงาม ไม้ริมทะเล

9. พอทูลาก้า (คุณนายตื่นสาย) แพรเซี่ยงไฮ้

ชื่อสามัญ : Portulaca; Portulaca rose, Rose mose, Sun plant
ชื่อวงศ์ : PORTULACACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Portulaca hybrids; P. grandiflora Hook.f.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่เตี้ย	ดิน : ร่วนปนทราย ระบายน้ำดี
ความสูง : 0.15 – 0.25 ม.	ความชื้น : ปานกลาง
ขนาดทรงพุ่ม : 0.2 – 0.5 ม.	แสง : แดดเต็มวัน มากกว่า 6 ชม.
ผิวสัมผัส : ละเอียด	โรค/แมลง : -
ลำต้น : สีเขียว	อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
ใบ : สีเขียวเข้ม; สีเขียว	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35 – 40/m² (bag) ห่าง 25/m² (bag)
ดอก: สีชมพู ขาว เหลือง กลีบเดี่ยว; มีทั้งกลีบเดี่ยว และซ้อน ชมพูอ่อน - ชมพูเข้ม	
กลิ่น : -	
ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	

การใช้งาน:
- เหมาะปลูกตามซอกหิน ขอบแปลงสวนหย่อม ระหว่างทางเดินเท้าหรือปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆ โดยเฉพาะที่แห้งแล้ง
- ปลูกคลุมดินในสวนหย่อมที่มีจันทร์ผา ชวนชมเป็นประธาน
- พอทูลาก้ามีดอกใหญ่ สวยงามกว่าแพรเซี่ยงไฮ้แต่ต้องตัดกิ่งปักชำใหม่เมื่อมีดอกและต้นเริ่มทรุดโทรมแล้ว เลี้ยงง่าย

10. ฟ้าประดิษฐ์

ชื่อสามัญ : Ground morning glory
ชื่อวงศ์ : CONVOLVULACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Convolvulus mauritianus Boiss.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่เลื้อย	ดิน : ร่วน ระบายน้ำดี
ความสูง : 0.1 – 0.3 ม.	ความชื้น : ปานกลาง
ขนาดทรงพุ่ม : 0.3 – 0.4 ม.	แสง : แดดเต็มวัน
ผิวสัมผัส : ละเอียด	โรค/แมลง : เน่าตายถ้าน้ำขังแฉะ
ลำต้น : สีเขียว	อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
ใบ : สีเขียวปนเทา	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m² (bag) ห่าง 25/m² (bag)
ดอก: สีน้ำเงินอมม่วง	
กลิ่น : -	
ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	

การใช้งาน:
- นิยมปลูกในกลุ่มสวนสน แอหนัง เวอร์บีน่า
- ใช้ประกอบสวนหย่อมทั่วไป ทนสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี ยกเว้นในพื้นที่ที่มีน้ำขังแฉะ
- ตัดแต่งทรงพุ่มได้บ้างแต่จะไม่สูงเกิน 0.30 เมตร ไม้ริมทะเล

11. หนวดปลาดุก; หนวดปลาดุกแคระ

ชื่อสามัญ : -
ชื่อวงศ์ : LILIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker – Gawl.; O. japonicus (L.f.) Ker – Gawl. 'Compactus'

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แตกกอกลม	ดิน : ชุ่มชื้น ระบายน้ำดี
ความสูง : 0.10 – 0.15 ม.; 0.03 – 0.05 ม.	ความชื้น : ปานกลาง
ขนาดทรงพุ่ม : 0.1 – 0.2 ม.	แสง : ร่มรำไร แดดเช้า
ผิวสัมผัส : ละเอียด	โรค/แมลง : น้ำมากปลายใบไหม้เป็นสีน้ำตาล
ลำต้น : สีเขียว	อัตราการเจริญเติบโต : ช้า
ใบ : สีเขียวเข้ม	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 65/m² (4") ห่าง 45/m² (4")
ดอก: สีขาว	
กลิ่น : -	
ช่วงการมีดอก : ฤดูร้อน	

การใช้งาน:
- คลุมดินแทนหญ้าในสวนริมน้ำตกหรือสวนญี่ปุ่น ให้ความรู้สึกชุ่มชื้นดี
- ควรเป็นแปลงปลูกที่ไม่ใหญ่มากนัก
- ใช้ประกอบกับไม้ที่มีลักษณะใบคล้ายกัน เช่น เศรษฐีไซ่ง่อน ซุ้มกระต่ายเขียว เศรษฐีเรือนนอก เศรษฐีเรือนใน

12. หัวใจม่วง

ชื่อสามัญ : Purple heart
ชื่อวงศ์ : COMMELINACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tradescantia pallida (Rose) D. Hunt.

ลักษณะ	ลักษณะนิสัย
รูปทรง : แผ่เลื้อย	ดิน : ทั่วไป
ความสูง : 0.2 – 0.5 ม.	ความชื้น : ปานกลาง
ขนาดทรงพุ่ม : 0.15 – 0.30 ม.	แสง : แดดเต็มวัน - ร่ม
ผิวสัมผัส : หยาบ	โรค/แมลง : โคนเน่า หอยทาก
ลำต้น : สีม่วง อวบน้ำ	อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ใบ : สีม่วง	ระยะปลูกที่ใช้ในการจัดจริง : ถี่ 35/m² (bag) ห่าง 25/m² (bag)
ดอก: สีชมพูอ่อน	
กลิ่น : -	
ช่วงการมีดอก : ตลอดปี	

การใช้งาน:
- ใบสีม่วงสดใสตัดกับสีเหลืองทองได้ดี ไม้ริมทะเล
- โคนเน่าง่ายในฤดูฝน ควรยกแปลงปลูกให้การระบายน้ำดี
- ทรงพุ่มใบค่อนข้างยืดยาว ควรตัดแต่งบ่อยๆ

บรรณานุกรม

หอพฤกษศาสตร์ มูลนิธิสวนหลวง ร.9

เอื้อมพร วีสมหมาย, ศคิยา ศิริพานิช, อลิศรา มีนะกนิษฐ และณัฏฐ พิชกรรม. พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม 1. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ เอช แอนด์ เอน กรุ๊ป จำกัด, พ.ศ.2551.

เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิทาน แก้วดวงเทียน. ไม้ป่ายืนต้นในประเทศไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ เอช แอนด์ เอน กรุ๊ป จำกัด, พ.ศ.2547.

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม. คู่มือการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, พ.ศ. 2547.

คณะกรรมการบรรณาธิการสำนักพิมพ์บ้านและสวน. สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย เล่ม 2 . พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์บ้านและสวน โรงพิมพ์บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), พ.ศ.2543.

ผศ. ดร.จิรายุพิน จันทรประสงค์ และวชิรพงศ์ หวลบุตตา. ไม้ต้นประดับเล่ม 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์บ้านและสวน.

เว็บไซต์

อาจารย์เอื้อมพร วีสมหมาย. ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตย์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Home/SelectTypeSearch.html. (วันที่ค้นข้อมูล : พฤศจิกายน 2552).

ฐานข้อมูลทรัพยากรพืชพรรณ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://clgc.rdi.ku.ac.th/resource/rindex.html (วันที่ค้นข้อมูล : พฤศจิกายน 2552).

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://prathom.swu.ac.th/panmai (วันที่ค้นข้อมูล : พฤศจิกายน 2552).

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :http://th.wikipedia.org/wiki (วันที่ค้นข้อมูล : พฤศจิกายน 2552).

สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนพระมารดานิจนุเคราะห์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pramanda.ac.th/botany/doc/botany2552-1.xls (วันที่ค้นข้อมูล : มกราคม 2553).

รายชื่อพรรณไม้โรงเรียนบ้านแม่กวัก อำเภองาว จังหวัดลำปาง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.forest.go.th/silvic/WP_SVGStations/S_Stations/North_Stations/Mae_Huad/activity/Mae%20Kuag/plant_name.htm (วันที่ค้นข้อมูล : มกราคม 2553).

เดอะการ์เด้นทรี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thegreen-tree.com/product.detail_489515_th_2292956 (วันที่ค้นข้อมูล : มกราคม 2553).

เว็บพรรณพฤกษ์ไพรดอกไม้สายเหนือของ 026. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.sarapad.com/026/flower.asp?mytext=namethai (วันที่ค้นข้อมูล : มกราคม 2553).

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.dnp.go.th/FIG/pests/others/sinoxylon_t.htm (วันที่ค้นข้อมูล : มกราคม 2553).

มะรุม พืชมหัศจรรย์ ฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://thaiherb.most.go.th/plantdetail.php?id=368 (วันที่ค้นข้อมูล : มกราคม 2553).

ภาพจากเว็บไซต์

พรรณพฤกษชาติของอีสาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :http://www.qsbg.org/Webboard/webboard_Detail-1.asp?Board_ID=533 (วันที่ค้นข้อมูล : มกราคม 2553).

ขี้เหล็กอเมริกัน ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://202.143.171.60/botany/php/indextree.php (วันที่ค้นข้อมูล : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552).

ซงโด แหล่งเรียนรู้ชุมชนออนไลน์ ถนนคนลำฝัน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.trytodream.com/topic/3621 (วันที่ค้นข้อมูล : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552).

ทองหลางด่าง, ปาล์มหางจิ้งจอก ทะเบียนพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.wattano.ac.th/wattano51/Web_saunpluak/ทะเบียนพรรณไม้/Hip8.html (วันที่ค้นข้อมูล : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552).

ประดู่แดงที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชานชลาแห่งการเรียนรู้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://share.psu.ac.th/blog/soda/9186 (วันที่ค้นข้อมูล : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552).

สัตบรรณ วิชาการดอทคอม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=94709 (วันที่ค้นข้อมูล : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552).

มะขาม คลังสื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.sema.go.th/files/Content/Non_formal/0066/images/pantippana/pages/173.html (วันที่ค้นข้อมูล : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552).

Paul L. Redfearn, Jr., PHOTOGRAPHS OF FLOWERING PLANTS OF THE OZARKS AND THE INTERIOR HIGHLANDS OF NORTH AMERICA. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://biology.missouristate.edu/Herbarium/Plants%20of%20the%20Interior%20Highlands/Plants_of_the_Interior_Highlands_S.htm (วันที่ค้นข้อมูล : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552).

โกสน สวนพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.udvc.ac.th/images/tree/b1/Index1.htm (วันที่ค้นข้อมูล : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552).

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.wattano.ac.th/wattano51/Web_saunpluak/My%20Hip/153.html (วันที่ค้นข้อมูล : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552).

มะฮอกกานีใบเล็ก สวนรุชชาติโปงสลี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.dnp15.com/PongSalee/16.html (วันที่ค้นข้อมูล : มกราคม 2553).

เทียดหยดด่าง ภรรัตน์การ์เด้น. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pornratgarden.com/hi_tianyot_dang.html (วันที่ค้นข้อมูล : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552).

กัญญา. กัลปพฤกษ์ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://gotoknow.org/blog/acckku/189031 (วันที่ค้นข้อมูล : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552).

กาสะลองคำ พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นไม้มงคลจังหวัดเชียงราย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://zapacr.igetweb.com/index.php?mo=3&art=224359 (วันที่ค้นข้อมูล : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552).

ทองกวาว - ดอกไม้ปลายหนาว. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nulaw-08&month=02-2009&date=05&group=7&gblog=9 (วันที่ค้นข้อมูล : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552).

Wasawat Deemarn . "เหลืองอินเดีย" ฉันเป็นต้นไม้สีเหลืองที่เสมือนภาพวาด . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://gotoknow.org/blog/travel-stories/250572 (วันที่ค้นข้อมูล : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552).

ภาคผนวก

	ชื่อต้นไม้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประเภทของต้นไม้							แสง	รูปทรง	ความสูง (ม.)	ขนาดพุ่ม (ม.)	การเจริญเติบโต			ใบ		ดิน					สีดอก	สีใบ
			ทนน้ำท่วม	ทนลมแรง	ทนแล้ง	ไม่ตัดแต่ง	ไม่รบกวนถนน	ไม่รบกวนฐาน	ทำลายสิ่งปลูกสร้าง					ช้า	ปานกลาง	เร็ว	ผลัดใบ	ไม่ผลัดใบ	ดินสมบูรณ์	ดินร่วน	ดินทราย	ดินเค็ม	ดินทั่วไป		
1. ไม้ระดับสูง (ไม้ยืนต้น)																									
ก	กระดังงาไทย	Cananga odorata (Lam.) Hook. f & Thomson var. odorata				●				แดดเต็มวัน	พีระมิด	8-15	3-4			●	●						●	เหลืองแกมเขียวอ่อน	เขียว
	กระทินณรงค์	Acacia auriculaeformis A. Cunn. ex Benth.	●					●		แดดเต็มวัน	กลม	7-10	4-5			●		●		●	●			เหลืองสด	เขียวอมเหลือง
	กระทิง, สารภีทะเล	Calophyllum inophyllum L.					●	●		แดดเต็มวัน-ร่ม	กลม	5-12	6-8		●			●				●	●	ขาว	หลังใบสีเขียวท้องใบสีเขียวนวล
	กล้วยพัด, กล้วยลังกา	Ravenala madagascariensis Sonn						●		แดดเต็มวัน	คล้ายปาล์ม	15	3	●				●					●	ขาว	เขียว
	กันเกรา, มันปลา, ตำเสา	Fagraea fragraes Roxb.			●					แดดเต็มวัน	ไข่	10-15	4-6	●			●						●	เริ่มบานสีขาว เปลี่ยนสีเหลืองนวลอมแสด	สีเขียวเข้มเป็นมัน
	กัลปพฤกษ์	Cassia bakeriana Craib					●			แดดเต็มวัน	แผ่กว้าง	5-12	7-8		●		●			●			●	ชมพูเข้มเปลี่ยนเป็นชมพูอมขาว	สีเขียวเข้ม
	กาฬพฤกษ์	Cassia grandis L.f.								แดดเต็มวัน	แผ่กว้าง	20	10-15		●		●			●				แดงคล้ำเปลี่ยนเป็นชมพูอมส้ม	หลังใบสีเขียวเข้มท้องใบสีเขียวอ่อน
	กุ่มน้ำ	Crateva magna (Lour.) DC.	●							แดดเต็มวัน	กลม	4-20	5-8	●	●		●						●	เหลืองนวล	เขียว
	กุ่มบก	Crateva adansonii DC. ssp. trifoliata (Roxb.) Jacobs			●					แดดเต็มวัน	กลม	5-25	5-8	●	●		●						●	ขาวเปลี่ยนเป็นสีนวลเกสรสีม่วง	เขียว
ข	ข่อย	Streblus asper Lour	●		●			●		แดดเต็มวัน	ไข่	5-10	5-6	●			●			●	●			ดอกตัวเมียสีขาวเหลืองอ่อน ดอกตัวผู้สีเขียวอ่อน	เขียว
	ขี้เหล็ก	Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby	●	●			●			แดดเต็มวัน	กลม	10-15	4-6			●		●			●		●	เหลือง	เขียว
	ขี้เหล็กอเมริกัน	Senna spectabilis (DC.) Irwin & Barneby					●			แดดเต็มวัน	แผ่กว้าง	3-8	6				●	●					●	เหลือง	เขียว
ค	คอร์เดีย	Cordia sebestena L.						●		แดดเต็มวัน	ไข่, ไข่กว้าง	10	3-4		●			●	●					แสด	เขียว
	แคฝรั่ง	Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.								แดดเต็มวัน	แผ่กึ่งก้าน	5-15	6-7			●	●						●	สีขาวหรือชมพู	หลังใบสีเขียวเข้มท้องใบสีนวล
	แคแสด	Spathodea campanulata P. Beauv						●		แดดเต็มวัน	กระบอก	7-23	4-7			●	●			●				แดงแสด	เขียวเข้ม
จ	จามจุรี, ก้ามปู, ฝักฉา	Samanea saman (Jacp.) Merr	●					●	●	แดดเต็มวัน	ร่ม/แจกัน	15-20	10-20			●	●			●			●	ชมพู	เขียวเข้มเป็นมัน
	จำปา	Magnolia champaca (L.) Baillon ex Pierre								แดดเต็มวัน	พีระมิด	10-15	4-5			●		●					●	เหลืองส้ม	หลังใบสีเขียวอ่อน ท้องใบสีขาว
	จำปี	Magnolia x alba (DC.) Figlar								แดดเต็มวัน	พีระมิด	10-15	3-6			●		●					●	ขาวงาช้าง	เขียวอ่อน
ช	ชงโค, เสี้ยวดอกขาว, เสี้ยวดอกแดง	Bauhinia purpurea L.; B. variegata L.						●		แดดเต็มวัน	กลม	5-15	3-5		●		●						●	ชมพู-ม่วงเข้ม;ขาว	เขียวอ่อน
	ชมพูพันธ์ทิพย์	Tabebuia rosea (Bertol.) DC.	●				●			แดดเต็มวัน	แผ่ชั้นๆ	8-18	8-12			●	●						●	ชมพูสด, ชมพูอ่อนหรือขาว	เขียว
	ชัยพฤกษ์	Cassia javanica L. subsp. javanica								แดดเต็มวัน	แผ่ไม่เสมอ	5-15	5-6		●		●				●		●	ชมพูเปลี่ยนเป็นแดงเข้มและขาว	เขียว
ต	ตะโกนา	Disopyros rhodocalyx Kurz		●						แดดเต็มวัน	ไข่	6-8	4-5		●			●			●		●	ขาวครีม	เขียวมัน
	ตะแบก	Lagerstroemia floribunda Jack					●			แดดเต็มวัน	ไข่	15-30	5-7	●			●			●				ม่วงปนชมพูแล้วเปลี่ยนเป็นขาว	เขียวนวลเป็นมัน ใบอ่อนสีแดง
	ตันหยง	Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd.						●		แดดเต็มวัน	แผ่กว้าง	4-8	4-6	●				●		●				ขาวอมเหลืองปนเขียว	เขียวเข้ม
	ตะแบเหลือง	Tabebuia argentea Britt.								แดดเต็มวัน	แผ่ชั้นๆ	8	4-5	●			●			●				เหลือง ออกที่ปลายกิ่ง	หลังใบสีเขียวเข้ม ท้องใบสีเงิน
	ตีนเป็ดน้ำ, ตีนเป็ดทะเล	Cerbera odollam Gaertn.	●	●			●	●		แดดเต็มวัน	กลม	5-7	8-10			●		●					●	ขาว	เขียวมัน
	ตีนเป็ดฝรั่ง	Crescentia alata HBK.		●				●		แดดเต็มวัน -ครึ่งวัน	แผ่กึ่งก้าน	4-10	4-6	●			●						●	ม่วงเข้มจนถึงน้ำตาล ปลายออกสีเขียว	เขียวอ่อน
	เต่าร้าง	Caryota mitis Lour,; C. cumingii Lodd. ex Mart,; C. gigas Hodel						●		แดดเต็มวัน -ครึ่งวัน	แตกกอ	10-12	3-4			●		●					●	ขาวครีม	เขียว
	แตรชมพู	Tabebuia pallida (Lindl.) Miers								แดดเต็มวัน	ไข่ตั้ง	5-8	3	●			●						●	ชมพูอ่อน	เขียว
ท	ทองกวาว	Butea monosperma (Lam.) Taub.			●		●	●		แดดเต็มวัน	ตั้งตรง	12-15	6-8	●			●						●	แดง ส้ม หรือเหลือง	เขียวทึบ
	ทองหลางด่าง	Erythrina variegat L.					●	●		แดดเต็มวัน	กลม	12	10-12			●	●						●	แดงเพลิง	เขียว
	ไทรด่าง, ไทรย้อยใบแหลมด่าง	Ficus benjamina L. Var. Variegata		●				●		แดดเต็มวัน-ร่ม	แผ่	10-15	>10	●				●					●	-	ขาวหรือครีม
	ไทรย้อยใบแหลม	Ficus benjamina L.	●	●		●		●	●	แดดเต็มวัน-ร่ม	แผ่กว้างห้อยย้อย	10	>10	●				●					●	-	เขียวอ่อน

	ชื่อต้นไม้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประเภทของต้นไม้							แสง	รูปทรง	ความสูง (ม.)	ขนาดพุ่ม (ม.)	การเจริญเติบโต			ใบ		ดิน					สีดอก	สีใบ
			ทนน้ำท่วม	ทนลมแรง	ทนแล้ง	ไม่ตัดแต่ง	ไม่รบกวนถนน	ไม่รบกวนฐาน	ทำลายสิ่งปลูกสร้าง					ช้า	ปานกลาง	เร็ว	ผลัดใบ	ไม่ผลัดใบ	ดินสมบูรณ์	ดินร่วน	ดินทราย	ดินเค็ม	ดินทั่วไป		
	ไทรอิเรกูล่า	Ficus celebensis Corner								แดดเต็มวัน	ห้อยย้อย	8-12	6-8		●			●		●	●			ขาว	เขียวสด
น	นนทรี	Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne					●	●		แดดเต็มวัน	กลม	25	10			●	●						●	เหลือง	เขียวสด
	น้ำเต้าต้น, น้ำเต้าญี่ปุ่น	Crescentia cujete L.						●		แดดเต็มวัน -ครึ่งวัน	แผ่กึ่งก้าน	3-8	4-6	●				●					●	เขียวอมเหลือง มีลายม่วงแดง	เขียวอ่อน
บ	บุนนาค	Mesua ferrea L.								แดดเต็มวัน	กระบอก	15-25	6-8	●				●		●				ขาวหรือเหลืองอ่อน	หลังใบสีเขียวท้องใบสีเขียวอมขาว
	บุหงาสำหรี	Citharexylum spinosum L.								แดดเต็มวัน	ตั้งตรง	3-10	2-3			●	●						●	ขาว	เขียวเปลี่ยนเป็นแดง
ป	ประดู่บ้าน	Pterocarpus indicus Willd.					●	●		แดดเต็มวัน	แผ่กว้าง	20	5-8			●	●						●	เหลือง	เขียว
	ประดู่แดง	Phyllocarpus septrentrionalis Donn. Sm.								แดดเต็มวัน	แผ่กว้างห้อยย้อย	20	5-6	●			●			●				แดงส้ม	เขียว
	ปาล์มขวด	Roystonea regia (Kunth) Cook						●	●	แดดเต็มวัน	ปาล์ม	15-20	4-5			●		●				●	●	ครีมมัน	เขียวสด
	ปาล์มดิง, ดิงปาล์ม	Archontophoenix alexandrae (F.J. Muell.) H.A. Wendl. & Drude								แดดเต็มวัน	ปาล์ม	15-20	3			●		●		●				ขาว	เขียวได้ใบเทาเงิน
	ปาล์มจีน, ปาล์มเขียงไข้	Livistona chinensis (Jacp.) R. Br. ex Mart.						●		แดดเต็มวัน	ปาล์ม	8-10	4	●				●					●	-	เขียว
	ปาล์มน้ำมัน	Elaeis guineensis Jacq.						●	●	แดดเต็มวัน	ปาล์ม	15-20	4-5	●				●				●	●	ตัวผู้สีขาวหม่นตัวเมียสีขาว	เขียว
	ปาล์มมงกุฎ, ปาล์มพัด	Pritchardia pacifica Seem. & H. Wendl.						●		แดดเต็มวัน	ร่าไร	10	3	●				●					●	เหลืองปนน้ำตาล	เขียวอ่อน
	ปาล์มหางหมาจิ้งจอก	Wodyetia bifurcata A.K. Irvine						●		แดดเต็มวัน	ปาล์ม	10-15	2.5-3		●			●		●			●	ขาว	เขียว
	ปีบ	Millingtonia hortesis L.f.					●			แดดเต็มวัน	ไข่	5-25	6-8			●		●		●				ขาว	เขียว
	ปีบทอง, กาสะลองคำ	Radermachera ignea (Kurz) Steenis								แดดเต็มวัน	ไข่	6-20	6-8	●			●						●	เหลืองอมส้มหรือส้ม	เขียว
	ปี้จั่น, พี้จั่น, กระพี้จั่น	Millettia brandisiana Kurz					●			แดดเต็มวัน	กลม	10-15	6-8		●		●						●	ขาวปนม่วง	เขียว
	แปรงล้างขวด	Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.)					●	●		แดดเต็มวัน	ห้อยย้อย	10-18	4-5		●			●					●	กลีบดอกสีขาว ก้านเกสรตัวผู้สีแดงหรือชมพู	เขียวอ่อน
ผ	ไผ่เลี้ยง, ไผ่สร้าง, ไผ่เขียงไพร	Bambusa multiplex (Lour.) Raevsch		●						แดดเต็มวัน	แตกกอ	15	4-6			●		●					●	-	เขียวอ่อน
	ไผ่เหลืองทอง, ไผ่ซางทอง	Phyllostachys sulphurea (Carr.) A. & C. Riv.		●						แดดเต็มวัน	แตกกอ	5-10	3-6			●		●					●	-	เขียว
พ	พญาสัตบรรณ	Alstonia scholaris (L.) R. Br.							●	แดดปานกลาง-แดดจัด	ไข่	20-30	5-7			●		●			●		●	ขาว, ขาวอมเหลือง	เขียว
	พะยอม	Shorea roxburghii G.Don								แดดเต็มวัน	ไข่	20-30	4-6		●		●		●		●			ขาว, หรือเหลืองอ่อน	เขียว
	พิกุล	Mimusops elengi L.					●			แดดเต็มวัน	กลม	5-18	4-3	●				●					●	ขาว	เขียวเข้ม
	โพธิ์	Ficus religiosa L.	●	●			●	●	●	แดดเต็มวัน	กลม	15	12		●		●						●	เหลืองนวล	เขียวอมเทา
ม	มะขาม	Tamarindus indica L.	●				●	●		แดดเต็มวัน	กลม	20	18-20	●				●					●	เหลืองอมส้ม มีจุดประสีแดง	ใบเขียวหม่น
	มะพร้าว	Cocos nucifera L.	●	●				●		แดดเต็มวัน	ปาล์ม	15-20	3	●				●					●	ขาว	เขียว
	มะม่วง	Mangifera indica L.								แดดเต็มวัน	กลม	10-15	4-7		●			●					●	นวล	เขียว
	มะสัง	Feroniella lucida (Scheff.) Swingle				●				แดดเต็มวัน	พีระมิด	4-8	2-3		●			●					●	เหลือง	เขียวเข้ม
	มะฮอกกานีใบเล็ก	Swietenia mahogani (L.) Jacq.						●		แดดเต็มวัน	กระบอก	15-18	5-6			●		●					●	เหลืองอมเขียว	หลังใบสีเขียวเข้มท้องใบสีเขียวอ่อน
	มะฮอกกานีใบใหญ่	Swietenia macrophylla King					●	●		แดดเต็มวัน	กระบอก	15-20	4-6			●		●		●				เหลืองอ่อน	หลังใบสีเขียวเข้มท้องใบสีเขียวอ่อน
ย	ยางอินเดีย, ยางอินเดียด่าง	Ficus elastica Roxb. ex. Hornem.; F. elastica Roxb. ex. Hornem ver. variegata		●				●	●	แดดเต็มวัน-ร่ม	แผ่กว้าง	5-10	>10			●		●					●	-	เขียว
ร	รัตนา	Parkinsonia aculeat L.			●					แดดเต็มวัน	ห้อยย้อย	4-10	5-6			●		●		●	●			เหลือง	เขียวเข้ม
	ราชพฤกษ์, คูน	Cassia fistula L.					●	●		แดดเต็มวัน	กลม	8-15	4-6		●		●						●	เหลืองสด	เขียวอ่อน
ล	ลั่นทม, ลีลาวดี	Plumeria spp.						●		แดดเต็มวัน	แผ่กึ่งก้าน	6-8	6-8	●			●			●	●			ขาว,เหลือง,แดง	หลังใบเขียวเข้มท้องใบสีเขียวนวล
	ลำดวน	Melodorum fruticosum Lour.								แดดเต็มวัน-ครึ่งวัน	ไข่	5-10	4-6	●				●		●				เหลืองนวล	หลังใบเขียวเข้มท้องใบสีเขียวนวล

	ชื่อต้นไม้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประเภทของต้นไม้: กันน้ำท่วม	ประเภทของต้นไม้: ไม้ดอกสวย	ประเภทของต้นไม้: ไม้ริมถนน	ประเภทของต้นไม้: ไม้ริมทะเล	ประเภทของต้นไม้: ทำลายสิ่งปลูกสร้าง	แสง	รูปทรง	ความสูง (ม.)	ขนาดพุ่ม (ม.)	การเจริญเติบโต: เร็ว	การเจริญเติบโต: ปานกลาง	การเจริญเติบโต: เร็ว	ใบ: ผลัดใบ	ใบ: ไม่ผลัดใบ	ดิน: ดินสมบูรณ์	ดิน: ดินร่วน	ดิน: ดินทราย	ดิน: ดินเค็ม	ดิน: ดินทั่วไป	สีดอก	สีใบ
	เลี่ยน	Melia azedarach L.			●			แดดเต็มวัน	กลม	10-20	3-5		●		●			●				ชมพู หรือขาวอมม่วง	เขียว
ศ	ศรีตรัง	Jacaranda obtusifolia Humb. & Bonpl. ssp. rhombifolia (G.Mey) A.Gentry		●				แดดเต็มวัน	ไม่สม่ำเสมอ	4-10	4-5	●			●		●					ม่วง	เขียวอ่อน
ส	สนฉัตร	Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco						แดดเต็มวัน	พีระมิด	>10	2.5	●				●					●	-	เขียว
	สนดินสอ	Cupressus sempervirens L. var. stricta						แดดเต็มวัน-แดดเช้า	ผอมสูง	1.5-4	0.5-1	●				●					●	-	เขียวเข้ม
	สนทะเล	Casuarina equisetifolia Forst. & Forst. f.	●	●			●	แดดเต็มวัน	พีระมิด	15-25	5-8			●		●			●	●	●	-	เขียวอ่อน
	สนประดิพัทธ์	Casuarina junghuhniana Miq.	●	●			●	แดดเต็มวัน	พีระมิด	15-30	5-8			●		●				●	●	-	เขียว
	สนมังกร	Juniperus chinensis L.						แดดเต็มวัน-แดดเช้า	พีระมิด	3-12	1-2	●				●					●	-	เขียวเข้ม
	สะเดาบ้าน	Azadirachta indica A. Juss. Var. siamensis Valeton				●	●	แดดเต็มวัน	กลม	8-15	3.5			●	●						●	ขาวนวล	เขียวเข้ม
	สาเก	Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg (Seedless form)						แดดเต็มวัน	แผ่กิ่งก้าน	15	8-9		●			●					●	-	เขียวเข้ม
	สารภี	Mammea siamensis Kosterm.				●	●	แดดเต็มวัน-ร่มรำไร	ไข่	10-15	5-7	●				●					●	ขาว ก่อนโรยเป็นสีเหลือง	เขียวมัน
	สาละลังกา, ลูกปืนใหญ่	Couroupita guianensis Avbl.						แดดเต็มวัน	กลม	15-30	4-6		●			●					●	ชมพูอมเหลืองและแดง	เขียว
	สุพรรณิการ์, ฝ้ายคำ	Cochlospermum religiosum (L.) Alston; C. regium (Mart. & Schrank) Pilg					●	แดดเต็มวัน	กลม	7-10	4-6		●		●						●	เหลือง	เขียวสด
	เสลา, อินทรชิต เสลาใบใหญ่	Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.				●		แดดเต็มวัน	กระบอก	5-15	5-6	●			●			●				ขาว, ม่วง, ม่วงอมชมพู	เขียว
	โสกน้ำ	Saraca indica L.	●			●		แดดเต็มวัน	แผ่กว้าง	20	>10		●			●					●	แดง	เขียว
	โสกพวง	Browenea ariza Benth.						แดดเต็มวัน-ครึ่งวัน	แผ่กว้าง	10-15	4-6		●			●					●	แดง	เขียว
	โสกเหลือง, ศรียะลา	Saraca thaipingensis Cantley ex Prain						แดดเต็มวัน-ร่มรำไร	กลม	12-15	4	●				●					●	เหลือง	เขียว
ห	หนวดปลาหมึก	Schefflera actinophylla (Endl.) Harms				●		แดดเต็มวัน	กระบอก	6-9	5-6		●			●		●				แดง	เขียวเข้ม
	หมากเยอะมัน, หมากนวล	Adonidia merrillii (Becc.)					●	แดดเต็มวัน	ปาล์ม	4-6	1.5-2.5		●			●					●	-	เขียวอ่อนภาบใบสีขาวนวล
	หลิว	Salix babylonica L.						แดดเต็มวัน	ห้อยย้อย	10-15	4-5			●		●		●				ขาว	เขียวอ่อน
	หางนกยูงฝรั่ง	Delonix regia (Bojer) Raf.				●	●	แดดเต็มวัน	ร่ม/แจกัน	10-15	8-12			●	●				●		●	สัมแดง, เหลือง	เขียว
	หูกวาง	Terminalia catappa L.			●		●	แดดเต็มวัน	พีระมิด	8-28	8-10			●	●						●	ขาวหรือเหลืองอ่อน	เขียวสด
	หูกวางแคระ, หูกระจง	Terminalia ivoriensis A Chev.			●	●	●	แดดเต็มวัน	ไข่	15-20	4-5			●	●						●	ขาว	เขียว
	เหลืองอินเดีย	Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson						แดดเต็มวัน	ไม่สม่ำเสมอ	5-9	5-8	●			●				●			เหลืองสด	เขียวเข้ม
อ	อโศกอินเดีย, อโศกเชนคาเปรียล	Polyalthia longifolia Benth. & Hook. f. var. pandurata				●		แดดเต็มวัน	ผอมสูง	6-15	2		●			●					●	ครีม	เขียวอ่อน
	อินทนิลน้ำ	Lagerstroemia speciosa (L.) Pers	●			●		แดดเต็มวัน	แผ่กลม	8-24	4-5	●			●			●				ม่วง,ชมพู,ขาว	เขียว
	อินทนิลบก	Lagerstroemia macrocarpa Wall				●		แดดเต็มวัน	ไข่	8-10	5-6	●			●			●				ม่วงเข้ม, ม่วงอ่อน ชมพูอ่อน,ชมพูม่วง	เขียวเข้ม
	อินทผลัม	Phoenix sp.		●		●	●	แดดเต็มวัน	ปาล์ม	15-18	3-4			●		●	●				●	-	สีเขียว

	ชื่อต้นไม้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประเภทของต้นไม้: กันน้ำท่วม	ประเภทของต้นไม้: ไม้ดอกสวย	ประเภทของต้นไม้: ไม้ริมถนน	ประเภทของต้นไม้: ไม้ริมทะเล	ประเภทของต้นไม้: ทำลายสิ่งปลูกสร้าง	แสง	รูปทรง	ความสูง (ม.)	ขนาดพุ่ม (ม.)	การเจริญเติบโต: เร็ว	การเจริญเติบโต: ปานกลาง	การเจริญเติบโต: เร็ว	ใบ: ผลัดใบ	ใบ: ไม่ผลัดใบ	ดิน: ดินสมบูรณ์	ดิน: ดินร่วน	ดิน: ดินทราย	ดิน: ดินเค็ม	ดิน: ดินทั่วไป	สีดอก	สีใบ
2. ไม้พุ่มสูง (ไม้ประดับกลาง-ใหญ่)																							
ก	กรรณิการ์	Nyctanthes arbor - tristia L.						แดดเต็มวัน	พีระมิด	2-3	2		●					●				ขาว	เขียว
	กระดังงาสงขลา	Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. fruticosa (Craib) Corner						แดดเต็มวัน	กลม	1-4	1-2	●	●					●				เหลือง	เขียวเข้ม
	กะพ้อ	Licuala spinosa Thunb.				●		แดดเต็มวัน-ร่ม	ปาล์ม	3-4	1.5-2		●								●	-	เขียวแก่
	กาหลง	Bauhinia acuminata L.						แดดเต็มวัน	กลม	3	2-3		●					●	●			ขาว	เขียว
	แก้ว	Murraya paniculata (L.) Jack			●	●		แดดเต็มวัน-ร่มรำไร	กลม	3-5	1-3		●						●			ขาว	เขียวเข้มเป็นมัน
	แก้วเจ้าจอม	Guaiacum offcinale L.						แดดปานกลาง	แผ่กลม	10-15	5-6	●						●				ฟ้า	เขียวเข้มเป็นมัน
ข	เข็มขาว	Ixora finlaysoniana Wall. ex G. Don						แดดเต็มวัน	แตกพุ่มที่ยอด	1.5-3	1-2	●									●	ขาว	เขียวเข้ม
	เข็มใบอ่อนขอบแดง	Dracaena cincta Bak.						แดดเต็มวัน-ครึ่งวัน	แตกพุ่มที่ยอด	3	1-2		●								●	ขาว	เขียวขอบใบสีแดง
ค	คริสต์มาส	Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch						แดดเต็มวัน	แผ่กว้าง	1-3	1.5-3.5		●								●	เหลือง	แดงและเขียว
	คำแสด, คำเงาะ	Bixa orellana L.						แดดเต็มวัน	กลม	5-10	4-5			●				●				ขาว	เขียวเข้ม
จ	จั๋งจีน	Rhapis humilis Blume				●		แดดเต็มวัน-ร่ม	แตกกอ	2-4	1.5-3	●						●				-	เขียวมัน
	จั๋งไทย	Rhapis laosensis Becc.				●		ร่มรำไร	แตกกอ	2-4	1.5-2	●						●				-	เขียว
	จันทน์ผา	Dracaena loureiri Gagnep.		●		●		แดดเต็มวัน-รำไร	แตกพุ่มที่ยอด	5-6	2.8	●									●	ขาว	เขียว
	ฉัตรแก้ว, ฉัตรนาค	Leea guineensis G.Don; L guineensis G. Don 'Burgandy'						ร่มรำไร	แผ่กิ่งก้าน	2-3	1-2		●								●	แดงเข้ม	เขียว, ม่วงแดง
ช	ชองออฟจาไมก้า	Dracaena reflexa (Decne.) Lam.						แดดเต็มวัน-ครึ่งวัน	ร่ม/แจกัน	2-3	1.5-2		●								●	ขาวนวล	เขียวแก่, ลายเขียวอ่อน
	ชองออฟอินเดีย	Dracaena reflexa (Decne.) Lam. 'Song of India'						แดดเต็มวัน	ร่ม/แจกัน	2-5	1.9-2	●						●	●			ขาวนวล	ริมใบด่างเหลืองกลางใบเขียว
ด	ดอนญ่าขาว, ดอนญ่าออโรร่า, ดอนญ่าลูซ	Mussaenda philippica A. Rich 'Dona Aurora'; M. philippica A. Rich 'Dona Luz'						แดดเต็มวัน	กลม	1.5-2.5	1.5-2			●							●	เหลือง	เขียวอ่อน
ต	เตย, เตยด่าง	Pandanus spp.	●	●		●		แดดเต็มวัน	แตกกอ	3-5	3-4			●					●		●	ครีม	เขียว
ท	ทรงบาดาล	Senna surattensis (Burm.f.) Irwin & Barneby		●	●	●		แดดเต็มวัน	กลม	3-7	2.5-3			●							●	เหลือง	เขียว
	ทองอุไร	Tecoma stans (L.) Kunth			●	●		แดดเต็มวัน	กลม	2-5	2-3			●				●				เหลืองสด	เขียวอ่อน
	เทียนหยด, ข่อม่วง	Dutanta erecta L.			●	●		แดดเต็มวัน	แผ่กว้าง	2-6	1-2			●							●	ขาว, ม่วง	เขียว
	ไทรทอง	Ficus microcarpa L.f. 'Golden Leaves'	●	●	●	●		แดดเต็มวัน	แผ่กว้าง	5-10	3-5	●									●	-	เหลืองปนเขียว
น	นางแย้ม	Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb.						แดดเต็มวัน-ครึ่งวัน	ร่ม/แจกัน	1-1.5	1-1.5		●					●				ขาว,กลีบนอกชมพูเข้ม	เขียวแก่
	นีออน	Leucophyllum frutescens (Berl.) I.M. Johnst.				●		แดดเต็มวัน	กลม	3-4	1-2			●							●	ม่วง	หลังใบสีเทาท้องใบสีเงิน
ป	ปรงญี่ปุ่น, สาคูปาล์ม	Cycas revoluta Thunb				●		แดดเต็มวัน	ปาล์ม	2-4	1.5-2.5	●									●	-	เขียวเข้ม
	ปรงทะเล	Cycas rumphii Miq.				●		แดดเต็มวัน	ปาล์ม	1.5-3	1.5-2		●							●	●	-	เขียวเข้ม
	ปรงมักซิกัน	Zamia furfuracea L.f.						แดดเต็มวัน	แตกกอ	1-3	1.5-2.5	●						●	●			-	เขียว
	ประยงค์	Aglaia odorata Lour.						แดดเต็มวัน	กลม	3-5	0.7-1.5	●									●	เหลือง	เขียวเข้ม
	ปาล์มจีบ	Licuala grandis H. Wendl.				●		ร่ม	ปาล์ม	2	1-1.5	●						●				ขาว	เขียวแก่
	ปาล์มแซมปญ	Hyophorbe lagenicaulis (L.H. Bail.) H.E. Moore				●		แดดเต็มวัน	ปาล์ม	3-4	1.5-2	●						●				-	เขียว
ผ	ไผ่น้ำเต้า	Bambusa ventricosa McClure	●					ร่มรำไร	แตกกอ	2-3	3-4	●									●	-	เขียว

	ชื่อต้นไม้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประเภทของต้นไม้: ทนน้ำท่วม	ทนลมแรง	ทนแล้ง	ไม้ตัดแต่ง	ไม้ริมถนน	ไม้ริมทะเล	ทำลายสิ่งปลูกสร้าง	แสง	รูปทรง	ความสูง (ม.)	ขนาดพุ่ม (ม.)	การเจริญเติบโต: ช้า	ปานกลาง	เร็ว	ใบ: พลัดใบ	ไม่พลัดใบ	ดิน: ดินสมบูรณ์	ดินร่วน	ดินทราย	ดินเค็ม	ดินทั่วไป	สีดอก	สีใบ
พ	พุดตาน	Hibiscus mutabilis L.								แดดเต็มวัน	กลม	1-3	1-2			●							●	เริ่มบานขาว เปลี่ยนเป็นชมพูและชมพูเข้ม	เขียว
	พู่จอมพล	Calliandra haematocephala Hassk					●			แดดเต็มวัน	แผ่กว้าง	3	2-3		●					●				แดงเข้ม	เขียวแก่
	พู่ชมพู	Calliandra surinamensis Benth.					●			แดดเต็มวัน	ร่ม/แจกัน	3	2-3		●								●	ชมพู	เขียวเข้มสดใส
ม	มิกกี้เม้าส์	Ochna kirkii Oliv.								แดดปานกลาง	กลม	1.5-2	1-1.5	●						●				ดอกเหลืองฐานรองดอกแดง	เขียวเข้ม
	โมก โมกลา โมกซ้อน	Wrightia religiosa Benth. ex Kurz	●					●		แดดเต็มวัน -รำไร	ร่ม/แจกัน	4-5	1.5-2	●							○		●	ขาว	เขียว
ย	ยี่เข่ง	Lagerstroemia indica L.						●		แดดเต็มวัน	ร่ม/แจกัน	5-7	2-4	●									●	ขาว, ชมพู, ม่วง	เขียว
	ยี่โถ	Nerium oleander L.			●		●	●		แดดเต็มวัน	แตกกอ	2-3	2		●					●			●	ขาว, แดง, ชมพูอ่อน, ชมพูเข้ม, เหลือง	เขียว
	โยทะกา, ชงโคดอกเหลือง	Bauhinia tomentosa L.								แดดปานกลาง	ร่ม/แจกัน	3	1-1.5			●				●				เหลือง	เขียวอ่อน
ร	ราชาวดี	Buddleja paniculata Wall.; davidii Franch								แดดเต็มวัน-ปานกลาง	กลม	3-5;2-6	1.5-2		●						●			ขาว,ม่วง	เขียวด้านบน สีเงินด้านล่าง
	รำเพย	Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum			●		●	●		แดดเต็มวัน	ร่ม/แจกัน	2-3	2		●						●			ขาว, เหลือง, ส้ม	เขียวสด
ว	วาสนา	Dracaena fragrans (L.) Ker – Gawl.						●		แดดปานกลาง	แตกกอที่ยอด	5-10	1-3		●								●	ชมพูอ่อนกึ่งขาว	หลายพันธุ์ขาวอมเขียว ลายเหลืองนวล
ส	สนมลู	Chamecyparis lawsoniana (Murray) Parl.								แดดเช้า-แดดเต็มวัน	พอมสูง	2-3	0.6-1	●						●				-	เขียวปนเทา
	สนสามร้อยยอด	Juniperus chinensis L.				●	●			แดดเต็มวันและแสง 30%	แผ่กว้าง	1.5-2	1.5-3		●								●	-	เขียว
	สนแผง	Platycladus orientalis (L.f.) Franco						●		แดดเต็มวัน	พุ่มช้างบิณฑ์	8	1-2	●									●	-	เขียว
	สาวสันทราย, จรกา, เกษรนลา	Clerodendrum quadriloculare (Blanco) Merr.								แดดเต็มวัน-ครึ่งวัน	ร่ม/แจกัน	2-5	1-2		●								●	ขาวอมม่วง	ด้านบนเขียว ด้านล่างสีม่วง
	สิบสองปันนา	Phoenix roebelenii O'Brien						●		แดดเต็มวัน	ปาล์ม	1-3	1.5-2	●	●					●				ขาว	เขียว
	แสงจันทร์	Pisonia grandis R. Br.						●		แดดเต็มวัน	แผ่กว้าง	5-6	2-4			●				●				-	เหลืองปนเขียว
ห	หมากเขียว	Ptychosperma macarthurii H. Wendl.; P. elegans (R. Br.) Blume						●		แดดเต็มวัน	แตกกอ	3-6	1.5-2.5		●					●				-	เขียวแก่-อ่อน
	หมากแดง	Cyrtostachys renda Blume						●		แดดเช้า-ค่อนข้างร่ม	แตกกอ	4-5	1.5-2.5		●					●				-	เขียวแก่
	หมากเหลือง	Chrysalidocarpus lutescens (Bory) H.A. Wendl.						●		แดดเต็มวัน-ร่ม	แตกกอ	3-5	2-3.5			●					●			-	เหลืองอ่อนปนชมพูหรือส้มเล็กน้อย
	หลิวทอง	Melaleuca bracteata F. Muell. 'Revolution Gold'				●				แดดเต็มวัน	กลม	5-8	3-4			●							●	-	เขียวอมเหลือง
	หางนกยูงไทย	Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.		●			●	●		แดดเต็มวัน	ร่ม/แจกัน	3-5	2-3			●							●	แดง, เหลือง, ชมพู	เขียวนวล
	เหลืองออสเตรเลีย	Senna pallida (Vahl) Irwin & Barneby				●	●			แดดเต็มวัน	ร่ม/แจกัน	3-4	2-3	●						●	●			เหลือง	เขียวอ่อน
3. ไม้พุ่มกลาง (ไม้ระดับกลาง-เล็ก)																									
ก	กล้วยแดง, กล้วยด่าง	Heliconia indica Lam								แดดครึ่งวัน	ตั้งตรง	1.5-2	0.6-1		●								●	-	เขียวปนแดง, เขียวปนขาว
	ก้ามกุ้ง	Heliconia psittacorum L.f.	●				●	●		แดดเต็มวัน-รำไร	แตกกอ	2-3	1-1.5			●							●	ชมพู,แสด,เหลือง	เขียวแก่
	กุหลาบพุกาม	Pereskia bleo (Kunth) DC.					●	●		แดดเต็มวัน	แตกกอ	2-3	1-2			●							●	ส้มอมแดง	เขียวอ่อน
	กุหลาบพุ่มเลื้อย, กุหลาบวาเลนไทน์	Rosa hybrid						●		แดดเต็มวัน	กลม	0.6-0.8	0.3-0.6			●				●				ส้ม,แดง	เขียวอ่อน, เขียวเข้ม

	ชื่อต้นไม้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประเภทของต้นไม้: ทนน้ำท่วม	ทนลมแรง	ทนแล้ง	ไม้ตัดแต่ง	ไม้ริมถนน	ไม้ริมทะเล	ทำลายสิ่งปลูกสร้าง	แสง	รูปทรง	ความสูง (ม.)	ขนาดพุ่ม (ม.)	การเจริญเติบโต: ช้า	ปานกลาง	เร็ว	ใบ: พลัดใบ	ไม่พลัดใบ	ดิน: ดินสมบูรณ์	ดินร่วน	ดินทราย	ดินเค็ม	ดินทั่วไป	สีดอก	สีใบ
	กุหลาบเมาะลำเลิง	Pereskia grandifolia Haw.					●	●		แดดเต็มวัน	แตกกอ	4	1-2			●							●	ชมพู	เขียวแก่
	โกสน	Codiaeum variegatum (L.) Blume					●	●		แดดเต็มวัน	กลม	1-2	0.7-1.5		●					●				-	หลากสี เช่น แดง เหลือง ลายจุด
ข	ขาไก่ด่าง	Justica fragilis Wall. 'Variegatum'					●	●		แดดเต็มวัน-รำไร	กลม	1-1.5	0.3-0.6			●							●	ขาว	เขียวปนเงินด่างม่วง
	ขาไก่เขียว	Justicia fragilis Wall.				●	●	●		แดดปานกลาง-แดดเต็มวัน	กลม	0.6-1.2	0.6			●							●	ขาว	เขียวมัน
	ขาไก่ไทย	Sericocalyx schomburgkii (Craib) Bremek					●	●		แดดเต็มวัน	กลม	0.6-1.2	0.6			●							●	ขาว	เขียวเข้ม
	ข้าวตอกพระร่วง	Ligustrum sinense Lour, 'Variegatum'								แดดเต็มวัน-รำไร	แผ่กลม	2-4	1-2		●					●				ขาว	เขียวอมเทา,ท้องใบสีอ่อน
	เข็มเชียงใหม่, เข็มญี่ปุ่น	Ixora spp.				●		●		แดดเต็มวัน	ตั้งตรง	0.3-1.5	0.3-0.8	●									●	ส้มแดง, ส้ม	เขียวเข้ม
	เข็มพิษณุโลก	Ixora hybrid				●		●		แดดเต็มวัน	ตั้งตรง	0.3-0.5	0.3-0.4	●						●				ชมพู, ขาว	เขียวมัน
	เข็มม่วง	Pseuderanthemum graciliflorum (Nees) Ridl.								แดดเต็มวัน-รำไร	กลม	1-2	0.6-0.8		●					●	●			ม่วงอ่อน	เขียวอ่อน
	เข็มสามสี	Dracaena cincta Bak. 'Troicolor'						●		แดดเต็มวัน	แตกพุ่มที่ยอด	1-2	0.3-0.6		●					●	●			-	เขียว ครีม หรือเหลืองแดง
	เข็มเศรษฐี	Ixora longifolia Sm.						●		แดดเต็มวัน	ร่ม/แจกัน	1-2	0.5-1			●							●	แดง, แดงอมส้ม	เขียวมัน
	เข็มเหลือง	Ixora chinensis Lam.						●		แดดเต็มวัน	กลม	1-2	0.5-1	●									●	เหลือง	เขียว
	เข็มอินเดีย	Pentas lanceolata (Forssk.) Defler.								แดดเต็มวัน	กลม	0.5-14	0.3-0.5		●					●				ขาว,ชมพู,แดง ม่วงกุหลาบ	เขียวอ่อน
ช	ชบา	Hibiscus rosa - sinensis L. and hybrid				●	●	●		แดดเต็มวัน	ร่ม/แจกัน	1-2	1-1.5		●								●	ขาว, ม่วง,ชมพู	เขียว
	ชบาจิ๋ว	Hibiscus hirtus L.								แดดเต็มวัน-ครึ่งวัน	กลม	0.6-0.8	0.5-0.6		●								●	ชมพูอมส้ม	เขียว
	ชบาด่าง 3 สี	Hibiscus rosa - sinensis L. 'Matensis'				●	●	●		แดดเต็มวัน	ร่ม/แจกัน	1-2	0.5-1			●							●	แดงสด	เขียว ขาว และชมพู
	ชบาหนู	Malvaviscus arboreus Cav.					●	●		แดดเต็มวัน	กลม	0.5-1	1-1.5		●								●	แดงอมส้ม	เขียว
	ชวนชม	Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.			●		●	●		แดดเต็มวัน	แผ่กิ่งก้าน	1-2	1-2	●						●				ชมพูสด	เขียวเข้มเป็นมัน
	ช้องนาง	Thunbergia erecta (Benth.) Anderson								แดดเต็มวัน-รำไร	กลม	1.8	1-2			●				●				ม่วง เกสรสีเหลืองขาว	เขียว
	ช้อนทอง, สร้อยสุวรรณ	Pseudomussaenda flava Verdc.								แดดเต็มวัน-ครึ่งวัน	กลม	1-2	1		●								●	เหลือง	เขียว
	ชาข่อย	Acalypha siamensis Oliv. ex Gage				●	●			แดดเต็มวัน-ครึ่งวัน	กลม	1	0.6		●								●	ขาว	เขียว
	ชาปัตตาเวีย, ชาประดับ	Malpighia coccigera L.				●				แดดปานกลาง-แดดเต็มวัน	ไม่สม่ำเสมอ	0.5-1	0.3-0.8	●						●				ชมพู-ขาว	เขียวเข้ม
	ชาฮกเกี้ยน, ชาดัด	Carmona retusa (Vahl) Masam.	●			●		●		แดดปานกลาง-แดดเต็มวัน	ไม่สม่ำเสมอ	0.3-1	0.3-0.6		●					●				ขาว	เขียวเข้ม
ต	ตรีชวา, เขียวพระสุจริต	Justicia betonica L.								แดดปานกลาง-แดดครึ่งวัน	กลม	1-2	0.5-1		●								●	ขาวหรือม่วงอ่อน	เขียวอ่อน
ท	ทองพันชั่ง	Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz								แดดปานกลาง	กลม	1-1.5	0.5-1.2		●								●	ขาว	เขียว
	เทียนทอง	Duranta erecta L.				●	●	●		แดดเต็มวัน	แผ่กว้าง	2-3	0.3-1		●								●	ม่วง	เหลืองทอง
	เทียนหยดด่าง, ชาด่าง	Duranta erecta L. 'Variegata'					●	●		แดดเต็มวัน	แผ่กว้าง	1-3	0.6-1.5			●							●	ขาว,ม่วง	เขียวอมขาวปนเหลือง
	เทียนหยดแคระ	Duranta erecta L.						●		แดดเต็มวัน	แผ่เตี้ย	0.3-0.6	0.3-0.5	●									●	ม่วง	เขียวอ่อน
บ	บลูฮาวาย	Otacanthus caeruleus Lindl.					●			แดดเต็มวัน	ไข่	0.5-0.9	0.3-0.8		●					●				ม่วงปนน้ำเงิน	เขียวเข้ม
	บานบุรีแคระ	Allamanda cathartic L.					●			แดดเต็มวัน	กลม	0.4-0.6	0.3-0.6			●						●		เหลือง	เขียวเทา

	ชื่อต้นไม้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประเภทของต้นไม้							แสง	รูปทรง	ความสูง (ม.)	ขนาดพุ่ม (ม.)	การเจริญเติบโต			ใบ		ดิน					สีดอก	สีใบ
			ทนน้ำท่วม	ทนลมแรง	ทนแล้ง	ไม้ตัดแต่ง	ไม้ริมถนน	ไม้ริมทะเล	ทำลายสิ่งปลูกสร้าง					ช้า	ปานกลาง	เร็ว	ผลัดใบ	ไม่ผลัดใบ	ดินสมบูรณ์	ดินร่วน	ดินทราย	ดินเค็ม	ดินทั่วไป		
	บานชั่วโมงวล	Turnera subulata G.E. Sm.						●		แดดเต็มวัน	แผ่เตี้ย	0.5-1	0.3-0.8		●					●				ขาวนวล	เขียว
	บานชั่วโมงเหลือง	Turnera ulmifolia L.			●					แดดเต็มวัน	กลม	0.6-1.2	0.3-0.6		●					●				เหลือง	เขียวเข้ม
	บานเย็น	Mirabilis jalapa L.								แดดเต็มวัน-ร่ำไร	แผ่เตี้ย	1.5	0.4			●							●	หลายสี-ขาว, เหลือง, ชมพู, บานเย็น	เขียว
	บานไม่รู้โรย	Gomphrena globosa L.								แดดเต็มวัน	กลม	0.15-0.6	0.4-0.5			●							●	หลายสี-ชมพู, ม่วง, แดง,ขาว	เขียว
	บานไม่รู้โรยฝรั่ง	Alternanthera dentata (Moench) Scheygr						●		แดดเต็มวัน	กลม	1-2	0.3-0.6			●							●	ขาว	แดงเข้ม
	ใบเงิน; ใบทอง; ใบนาก	Graptophyllum pictum (L.) Griff						●		แดดเต็มวัน-แดดครึ่งวัน	ร่ม/แจกัน	1-2	0.5-0.8			●							●	แดง	เขียวด่างขาว เหลืองตรงกลางใบ
ป	ประทัดจีน, ประทัดแดก	Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham.						●		แดดเต็มวัน	แผ่เตี้ย	1-2	0.5-1			●							●	แดงสด, ส้ม	เป็นฝอยเขียวสด
	ประทัดได้หวัน	Hamelia patens Jacq.								แดดเต็มวัน	กลม	2-3	0.5-1			●							●	แดง,ส้ม	เขียวปนส้ม
	ปัตตาเวีย	Jatropha integerrima Jacq.					●	●		แดดเต็มวัน	ร่ม/แจกัน	1.5-2	0.7		●								●	แดง,ชมพู	เขียวแก่
	ปาล์มไผ่	Chamaedorea erumpens H.E. Moore						●		ร่ม	แตกกอ	3-4	1.5-2	●						●				-	เขียวสด
ผ	ผกากรองต้น	Lantana spp.				●		●		แดดเต็มวัน	กลม	0.6-1.8	1-1.9			●				●	●			เหลือง, แดง, ชมพู, ขาว, ม่วง	เขียวอ่อน
	ผีเสื้อแสนสวย	Clerodendrum ugandense Prain					●			แดดเต็มวัน	กลม	1-1.5	1-1.5			●				●				ฟ้าอ่อน ฟ้าเข้ม	เขียว
	ไผ่จีน, ไผ่จีนด่าง	Arundinaria suberecta Munro								แดดเต็มวัน-ร่ำไร	แตกกอ	1-2	1.5		●								●	ต้นอ่อนดอกม่วง	เขียวแซมลายขาว
	ไผ่ฟิลิปปินส์	Dracaena surculosa Lindl.								แดดร่ำไร	แผ่เตี้ย	2-3;0.8	05-1;0306		●					●				ขาวนวล	เขียวเข้มมีจุดสีขาวปนเขียวอ่อน
พ	พยับหมอก, เจตมูลเพลิงฝรั่ง	Plumbago auriculata Lam.						●		แดดเต็มวัน	กลม	0.7-1	0.5-0.8		●					●				เทาฟ้า	เขียวเข้ม
	พยับแมงมุม,หญ้าหนวดแมว	Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.								แดดเต็มวัน-ร่ำไร	แผ่กว้าง	1-1.5	0.6		●					●				ขาวหรือม่วงอ่อนเหมือนสีฟ้า	เขียว
	พวงทองต้น	Thryallis glauca Kuntze						●		แดดเต็มวัน	กลม	0.5-1.2	0.4-0.6		●								●	เหลืองสด	เขียวอ่อน
	พวงแสดต้น, พวงเหลือง	Tecoma capensis (Thunb.) Lindl								แดดปานกลาง	แผ่กลม	1-1.5	1-2		●				●	●				แสด, เหลือง	เขียวเข้ม
	พัดโบก	Clerodendrum incisum Klotzsch var. macrosiphon (Hook.f.) Baker								แดดปานกลาง-แดดเต็มวัน	กลม	1-1.5	0.6-0.8		●								●	ขาว	เขียว
	พุดจีบ	Tacernaemontana divaricata (L.) R.Br.Ex Room & Schult								แดดครึ่งวัน-ร่ม	แผ่กว้าง	3-5	1-3		●					●	●			ขาว	เขียว
	พุดซ้อน	Gardenia augusta (L.) Merr.						●		แดดเต็มวัน	กลม	1-3	1-2	●						●				ขาวอมเหลือง	เขียวแก่
	พุดตะนเคง	Brunfelsia americana L.								แดดเต็มวัน	กลม	1-2.5	1-1.5		●					●				ขาวนวล	เขียว
	พุดเสามสี	Brunfelsia australis Benth.								แดดเต็มวัน-ครึ่งวัน	กลม	2	1-1.5		●					●				ม่วงแก่, ม่วงอ่อน, ขาว	เขียว
	พุทธรักษา	Canna hybrid	●				●			แดดเต็มวัน	ตั้งตรง	1.5	0.8		●					●				แดง,แสด,เหลือง,ชมพู	เขียว
	พู่เรือหงษ์	Hibiscus schizopetalus (Mast.) Hook.f.				●	●			แดดเต็มวัน-ร่ำไร	ร่ม/แจกัน	1.5-3	1-1.5		●								●	แดง	เขียวเข้ม
ม	มะขามเทศด่าง	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 'Variegata'						●		แดดเต็มวัน	กลม	2-3	1-3	●									●	ขาว	เขียว, ขาวใบอ่อนสีชมพู
	มะขุ้มมะเมีย, หมากผู้หมากเมีย	Cordyline fruticosa (L.) Copp.						●		แดดปานกลาง-ร่ำไร	แตกพุ่มที่ยอด	1.5-3	1.5-2		●								●	ชมพู, ขาว	เหลืองเขียว, เขียวแก่, เขียวอ่อน, ชมพู,แดง
ย	แย้มปีนัง	Strophanthus gratus Franch								แดดเต็มวัน	พุ่มเลื้อย	1-2	0.6-1.5			●				●	●			ม่วงเม็ดมะปราง	เขียวสด
ร	ระฆังทอง	Chrysothemis pulchella (Donn ex Sims) Decne								แดดปานกลาง-ร่ำไร	แผ่เตี้ย	1.3-1.6	0.3-0.5		●					●				เหลือง ก้านส้ม	เขียวเข้ม

	ชื่อต้นไม้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประเภทของต้นไม้							แสง	รูปทรง	ความสูง (ม.)	ขนาดพุ่ม (ม.)	การเจริญเติบโต			ใบ		ดิน					สีดอก	สีใบ
			ทนน้ำท่วม	ทนลมแรง	ทนแล้ง	ไม้ตัดแต่ง	ไม้ริมถนน	ไม้ริมทะเล	ทำลายสิ่งปลูกสร้าง					ช้า	ปานกลาง	เร็ว	ผลัดใบ	ไม่ผลัดใบ	ดินสมบูรณ์	ดินร่วน	ดินทราย	ดินเค็ม	ดินทั่วไป		
	ราตรี	Cestrum nocturnum L.								แดดปานกลาง-แดดเต็มวัน	กลม	2-3	1-2			●				●	●			ขาวอมเขียว	เขียว
ล	ลิ้นภระบือ	Excoecaria cochinchinensis Lour.					●	●		แดดเต็มวัน-ร่ำไร	กลม	1-1.5	0.3-0.8			●							●	เขียว	หลังใบเขียวเข้มท้องใบสีแดง
	ลิ้นมังกร	Sansevieria trifasciata Prain					●	●		แดดเต็มวัน-ร่ำไร	แตกกอตั้งตรง	0.3-0.8	0.5		●								●	เหลืองปนเขียว	ลายสีเขียวเข้มเขียวอ่อนและเหลือง
	เล็บครุฑ	Polyscias spp.					●	●		แดดเต็มวัน-ร่มร่ำไร	กลม	0.5-1	1-1.5		●					●				ขาว	สีด่างลายเขียวอ่อน-เข้ม
ว	แววิเชียร, พ่อเท็ดมีน้อท	Angelonia goyazensis Benth.								แดดครึ่งวัน	ตั้งตรง	0.6-1.2	0.3-0.6			●							●	ขาว, ม่วงอ่อน, ม่วงแก่	เขียวเทา
ส	สนเลื้อย	Juniperus horizontalis Moench								แดดเช้า	แผ่เลื้อย	0.3-0.8	0.3-1	●									●	-	เขียวปนเทา
	สังกรณีใบมัน	Crossandra infundibuliformis (L.) Nees								แดดเช้า	กลม	0.5-0.8	0.6-0.8			●				●	●			ส้ม	เขียวเข้ม
	สาวน้อยประแป้ง	Dieffenbachia spp.						●		ร่มร่ำไร	ตั้งตรง	0.5-1.5	0.5-1	●						●				-	เขียว อาจมีลายต่างๆ
	เสน่ห์จันทร์เขียว, เสน่ห์จันทร์ขาว, เสน่ห์จันทร์แดง	Homalomena rubescens Kunth; Homalomena sp; Homalomena lindenii (Rodigas) Lindl.						●		ร่ำไร	แตกกอ	0.5-1	1		●								●	-	เขียว
	แสยก	Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit.					●	●		แดดเต็มวัน	กลม	1-2	0.5			●							●	แดง	เขียว ต่างๆ เหลือง ขาว และชมพู
ห	หนวดปลาหมึกแคระ	Schefflera arboricola (Hayata) Hayata 'Compacta'					●			แดดปานกลาง-ร่ำไร	กลม	1-1.2	0.6-0.8		●								●	-	เขียว
	หนุมานประสานกาย	Schefflera leucantha R. Vig.								แดดเต็มวัน-ร่มร่ำไร	พุ่มเลื้อย	1.8-2.4	1		●					●	●			-	เขียว
	หวายไทย	Dracaena reflexa (Decne.) Lam.								แดดปานกลาง-ร่ำไร	ร่ม/แจกัน	1-2	0.6		●								●	ขาว	เขียวเข้ม
	หีบไม้งาม	Carissa grandiflora (E.Mey.) A.DC. 'Boxwood Beauty'				●				แดดเต็มวัน-ร่ำไร	ไม่สม่ำเสมอ	0.3-1.5	0.5-1	●						●				ขาว	เขียวเข้ม
	หูปลาช่อน	Acalypha wilkesiana Mull. Arg.				●	●	●		แดดเต็มวัน	กลม	1-2	0.6-1.5			●							●	-	แดง, เขียว
	เหลืองคีรีบูน	Pachystachys lutea Nees				●				ร่ำไร	ร่ม/แจกัน	0.6	0.6	●	●					●				ขาวปนครีม	เขียว
อ	อังกาบ	Barleria cristata L.								แดดปานกลาง	กลม	1-1.5	0.6-1		●					●	●			ม่วงแกมขาว, ม่วง	เขียวเทา
	อากาเว่	Agave spp.; Furcraea spp.					●	●		แดดเต็มวัน	แตกกอกลม	0.4-2	0.3-1	●						●	●			เหลือง	เขียว
	เอื้องทอง, กนกลายไทย	Sanchezia speciosa Leonard						●		แดดเต็มวัน-ครึ่งวัน	กลม	1-2	0.3-0.5			●				●				ส้มเหลือง	ขอบใบสีเขียว ลายเส้นกลางสีเหลือง
4. ไม้พุ่มเตี้ย (ไม้ระดับต่ำ-ใหญ่,เล็ก)																									
ก	กระดุมทองเลื้อย	Wedelia trilobata (L.) Hitchc.					●	●		แดดเต็มวัน-ร่มร่ำไร	แผ่เลื้อย	0.15	0.3			●							●	เหลืองสด	เขียวเข้ม
	กบหอยแครงแคระ	Tradescantia spathacea Sw.					●	●		แดดเต็มวัน-น้อย	แตกกอตั้งตรง	0.15-0.2	0.2-0.25			●							●	ขาว	ม่วงปนเขียว
	ก้ามปูหลุด	Tradescantia zebrina Loudon					●	●		แดดเต็มวัน-ร่มร่ำไร	แผ่เลื้อย	0.3	0.15			●							●	ม่วงอมชมพู	เขียวด่างขาวม่วง
	การะเกดหนู	Pandanus pygmaeus Thouars					●	●		แดดเต็มวัน	แตกกอกลม	0.3-0.6	0.5		●					●	●			-	เขียวปนเหลือง
	กำแพงเงิน	Dianella ensifolia (L.) DC.f. straminea (Yatabe) Kitamura					●			แดดเต็มวัน	แตกกอกลม	0.3-0.5	0.3-0.5			●							●	ขาว	เขียวสลับขาว เป็นทางยาว
	เกล็ดแก้ว	Alternanthera tenella Colla								แดดเต็มวัน	แผ่เลื้อย	0.1-0.2	0.2		●					●				-	เขียวปนขาวครีม
ข	เขียวหมื่นปี	Aglaonema spp.								ร่มร่ำไร 30%	ตั้งตรง	0.3-0.6	0.5		●					●				ครีม ฐานรองดอกสีขาว	สีเขียวปนขาวเป็นมัน

	ชื่อต้นไม้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประเภทของต้นไม้							แสง	รูปทรง	ความสูง (ม.)	ขนาดพุ่ม (ม.)	การเจริญเติบโต			ใบ		ดิน					สีดอก	สีใบ
			ทนน้ำท่วม	ทนลมแรง	ทนแล้ง	ไม้ตัดแต่ง	ไม้ริมถนน	ไม้ริมทะเล	ทำลายสิ่งปลูกสร้าง					ช้า	ปานกลาง	เร็ว	พลัดใบ	ไม่พลัดใบ	ดินสมบูรณ์	ดินร่วน	ดินทราย	ดินเค็ม	ดินทั่วไป		
ค	คล้า	Calathea spp.								ร่มรำไร	แตกกอ	0.5-0.7	0.5-0.7	●						●	●			ขาว	เขียว,เทาเงิน,เขียนอ่อน,ม่วงเข้ม
ง	เงินไหลมา	Syngonium podophyllum Schott	●				●			ร่มรำไร-ร่ม	ทอดยอด	0.3-0.5	0.3			●							●	-	เขียวลายขาว
ช	ชุ้มกระต่ายเขียว	Ophiopogon jaburan (Kunth) Lodd.								ร่มรำไร	แตกกอกลม	0.6	0.4-0.5		●					●				ขาว	เขียวเข้ม
ด	ดาดตะกั่ว	Hemigraphis alternata (Burm.f.) T. Anderson					●			แดดเต็มวัน-ครึ่งวัน	แผ่เลื้อย	0.2-0.3	0.2-0.3			●				●				ขาว	หลังใบสีเขียวปน เงินมัน ท้องใบสีแดง
	ดาดทับทิม	Hemigraphis alternata (Burm.f.) Anderson Exotica								ร่มรำไร	แผ่เลื้อย	0.15	0.3		●					●				ขาว	หลังใบสีม่วงเขียว ท้องใบสีแดง
	เดหลี, หน้าวัวไทย	Spathiphyllum sp.								รำไร	แตกกอ	0.8;0.5	0.6;0.4		●								●	ขาว	ก้านและแผ่นใบสีเขียวอ่อน
ต	เตยหอม	Pandanus amaryllifolius Roxb.	●					●		แดดเต็มวัน-ครึ่งวัน	แตกกอ	0.5-0.7	0.3-0.6			●				●				-	เขียวจัดเป็นมัน
บ	บุษบาฮาวาย	Asystasia gangetica (L.) T. Anderson 'Variegata'						●		แดดเต็มวัน	แผ่เตี้ย	0.1-0.3	0.2-0.3			●							●	ขาว	สีต่างขาวเขียวปนเหลืองเล็กน้อย
ป	ปีกแมลงสาบ	Elatostema repens (Lour.) Hallier f.& H. Schroet; E. pulchrum Hallier f.								ร่มรำไร	แผ่เลื้อย	0.08	0.2	●						●				ขาว	เขียวเทา
	เปปเปอร์โรเมีย	Peperomia spp.								ร่มรำไร	ทอดยอด	0.3	0.2		●					●				-	เขียวต่างขาวปนชมพูอ่อน
ผ	ผกากองเลื้อย	Lantana spp.					●	●		แดดเต็มวัน	แผ่เลื้อย	0.3-0.45	0.3			●				●				เหลือง, ม่วง, ชมพู, ขาว	เขียวสด
	ผักโขมแดง	Aerva sanguinolenta (L.) Blume								แดดเต็มวัน	ตั้งตรง	0.3	0.15			●				●			●	เหลือง	แดง
	ผักเป็ดเขียว,ผักเป็ดแดง	Alternanthera bettzickiana (Reg.) Nicholson						●		แดดเต็มวัน	แผ่เตี้ย	0.1-0.2	0.2			●				●	●			ขาว	เขียว, แดง
พ	พรมกำมะหยี่	Episcia cupreata (Hook.) Hanst.								ร่มรำไร	แผ่เลื้อย	0.1	0.15		●					●				แดง	เขียว
	พลับพลึงตีนเป็ด	Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb.	●				●	●		แดดเต็มวัน-ร่มรำไร	แตกกอกลม	0.4-0.5	0.6-0.8		●								●	ขาว	เขียวเข้มเป็นมัน
	พลับพลึงทอง	Crium zanthophyllum Hannibal	●				●	●		แดดเต็มวัน	แตกกอกลม	1-1.5	1-1.2			●						●	●	ขาว	เหลืองทองปนเขียว
	พลับพลึงหนู	Hymenocallis spp.	●				●	●		แดดเต็มวัน-ครึ่งวัน	แตกกอกลม	0.6	0.3		●					●				ขาว	สีเขียวเข้ม
	พลูด่าง	Epipremnum aureum (Lind.& Andre) Bunting	●				●	●		ร่มรำไร-แดดปานกลาง	ทอดยอด	-	0.2			●							●	-	เขียวด่าง, เขียวเหลือง
	พอทูลากัก, แพรเซี่ยงไฮ้	Portulaca hybrids; P. grandiflora Hook.f.					●	●		แดดเต็มวัน มากกว่า 6 ชม.	แผ่เตี้ย	0.15	0.2			●				●	●			ชมพู,ขาว,เหลือง	เขียวเข้ม; เขียว
	แพงพวยฝรั่ง	Catharanthus roseus (L.) G.Don			●		●	●		แดดเต็มวัน	ตั้งตรง	0.3-0.6	0.5			●					●	●		ขาว, ชมพู	เขียวเป็นใบมันเส้นกลางสีขาว
ฟ	ฟ้าประดิษฐ์	Convolvulus mauritianus Boiss.						●		แดดเต็มวัน	กลม	0.3-0.4	0.3-0.4			●				●				น้ำเงินอมม่วง	เขียวเทา
	เฟิร์นก้างปลา, เฟิร์นใบมะขาม, เฟิร์นเกล็ดหอย	Nephrolepsis biserrata (Sm.) Schott 'Furcan', N. cordifolia (L.) Presl; N. cordifolia (L.) Presl 'Duffii' N. exaltata (L.) Presl 'Bostonjenis'								แดดครึ่งวัน-รำไร	แตกกอกลม	0.3-0.6	0.3-0.8		●								●	-	เขียว
	เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย	Asplenum nidus L.								แดดครึ่งวัน-รำไร	ใบแตกออกรอบฐาน	0.3-1	0.3-1		●					●				-	เขียว
ฤ	ฤาษีผสม	Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br.								แดดเต็มวัน	ตั้งตรง	0.3-0.5	0.3-0.5			●				●	●			ขาว, ม่วงอ่อน	เขียว แดง ลายด่าง
ว	ว่านรางเงิน	Hippeastrum reticulatum Herb.								รำไร	แตกหน่อ	0.6	0.3		●					●	●			ชมพู	เขียวเส้นกลางใบขาว
	ว่านสี่ทิศต่าง, รางทอง	Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. 'Variegata'						●		แดดเต็มวัน	แตกกอปืนแผง	0.3-0.4	0.3-0.5		●					●	●			ขาว	เหลืองสลับเขียว
	เวอร์บีน่า	Verbena hybrid								แดดเต็มวัน	แผ่กึ่งเลื้อย	0.3	0.3-0.5		●					●				ขาว,ชมพู,แดง,ม่วง	เขียวอ่อน
	แววมยุรา	Torenia fournieri Lind. ex Fourn.								แดดเต็มวัน	กลม	0.5-0.7	0.3-0.5			●							●	ม่วงหรือชมพู แต้มเหลือง	เขียว

	ชื่อต้นไม้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประเภทของต้นไม้							แสง	รูปทรง	ความสูง (ม.)	ขนาดพุ่ม (ม.)	การเจริญเติบโต			ใบ		ดิน					สีดอก	สีใบ
			ทนน้ำท่วม	ทนลมแรง	ทนแล้ง	ไม้ตัดแต่ง	ไม้ริมถนน	ไม้ริมทะเล	ทำลายสิ่งปลูกสร้าง					ช้า	ปานกลาง	เร็ว	พลัดใบ	ไม่พลัดใบ	ดินสมบูรณ์	ดินร่วน	ดินทราย	ดินเค็ม	ดินทั่วไป		
ฟ	เศรษฐีเซ่งอ่น, ชุ้มกระต่ายด่าง	Ophiopogon jaburan (Kunth) Lodd.						●		แดดเช้า-แดดเต็มวัน	แตกกอกลม	0.35	0.3		●								●	ขาวมัน	เขียว, ขาว
ศ	เศรษฐีเรือนนอก	Chlorophytum bitchetii (Karrer) Backer								ร่มรำไร	แตกกอกลม	0.15-0.2	0.2		●					●				ขาว	เขียวมัน ขอบขาว
	เศรษฐีเรือนใน	Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques								ร่มรำไร	แตกกอกลม	0.2	0.2		●					●				ขาว	เขียวมัน กลางใบขาว
ห	หนวดปลาดุก	Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker - Gawl.								ร่มรำไร	แตกกอกลม	0.15	0.1	●					●	●				ขาว	เขียวเข้ม
	หลิวไต้หวัน	O. japonicus (L.f.) Ker-Gawl 'Compactus'					●			แดดเต็มวัน	แผ่เตี้ย	0.3-0.5	0.3-0.5			●				●	●			ม่วงสด, ขาว	เขียวเข้มเป็นมัน
	หลิวใบ, หลิวญี่ปุ่น	Phyllanthus myrtifolius Moon.			●		●	●		แดดเต็มวัน-ร่มรำไร	แตกกอกลม	0.3-0.6	0.2-0.5			●							●	แดง	เขียว
	หัวใจม่วง	Tradescantia pallida (Rose) D. Hunt.						●		แดดเต็มวัน-ร่ม	แผ่เลื้อย	0.5	0.15		●								●	ชมพูอ่อน	ม่วง
อ	แอหนัง	Crossostephium chinense (L.) Mak.								แดดเต็มวัน	กลม	0.3-0.5	0.2-0.4		●					●				เหลือง	เทาเงิน
5.	**ไม้คลุมดิน (ไม้เลื้อย)**																								
ก	กระเทียมแก	Mansoa alliacea (Lam.) A. Gentry					●	●		แดดเต็มวัน	เถาใหญ่	-	-			●		●					●	ม่วงชมพู	เขียว
	การเวก	Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari A. siamensis Miq.					●	●		แดดเต็มวัน	เถาใหญ่	-	-			●		●					●	เขียวมีขน แก่เป็นสีเหลือง	เขียวเข้มเป็นมัน
จ	จันทร์กระจ่างฟ้า	Mandevilla sp.								แดดเต็มวัน	เถากลาง	-	-			●		●					●	เหลืองสดใส	เขียวสด
ช	ชมนาด, ชำมะนาด	Vallaris glabra (L.) Kuntze								แดดเต็มวัน-รำไร	เถากลาง	-	-		●			●					●	ขาวอมเขียว	เขียวแก่เป็นมัน
ต	ตีนตุ๊กแก	Ficus Pumila L.								แดดเต็มวัน-รำไร	เถาเล็ก	-	-	●				●		●	●			-	เขียวรูปหัวใจ
ถ	ถ้วยทอง	Solandra grandiflora Sw.						●		แดดเต็มวัน	เถาใหญ่	-	-			●		●					●	ขาว	เขียว
บ	บานบุรีเลื้อยเหลือง	Allamanda, Cathartica L.					●	●		แดดเต็มวัน	เถากลาง	-	-			●		●					●	เหลืองสดใส	เขียว
	ใบระบาด	Argyreia nervosa (Burm.f.) Bojer						●		แดดเต็มวัน	เถาใหญ่	-	-			●		●					●	ชมพู,ม่วง	เขียว
ผ	ผักบุ้งทอง	Merremia tuberosa (L.) Rendle						●		แดดเต็มวัน	เถาเล็ก	-	-			●		●					●	เหลืองทอง	เขียว
	ผักบุ้งฝรั่ง	Ipomoea purpurea (L.) Roth						●		แดดเต็มวัน	เถาเล็ก	-	-			●		●					●	ม่วง	เขียว
พ	พวงแก้ว, พวงเงิน หัวใจแดก, มังกรคาบแก้ว	Clerodendrum thomsoniae Balf. f.						●		แดดเต็มวัน -ครึ่งวัน	เถาเล็ก	-	-		●			●					●	แดงเข้มเป็นช่อ กลีบเลี้ยงสีขาว	เขียว
	พวงคราม	Petrea volubils L.			●					แดดเต็มวัน	เถากลาง	-	-	●			●						●	ม่วง	เขียว
	พวงชมพู	Antigonon leptopus Hook. & Arn.						●		แดดเต็มวัน	เถากลาง	-	-			●		●					●	ชมพู, ขาว	เขียว
	พวงทองเครือ	Tristellateia australasiae A. Rich								แดดเต็มวัน	เถาใหญ่		-		●			●					●	เหลืองสด	เขียว
	พวงทองเถา	Stigmaphyllon ellipticum (HBK.) juss.								แดดเต็มวัน	เถาเล็ก	-			●			●					●	เหลือง	เขียว
	พวงประดิษฐ์	Congea tomentosa Roxb.					●			แดดเต็มวัน	เถาใหญ่	-	-		●		●			●				ขาว	เขียว ใบประดับสีชมพูถึงม่วงแก่
	พวงแสดเถา	Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) Miers					●			แดดเต็มวัน	เถาเล็กอ่อน	-	-			●		●					●	แสด	เขียว
ฟ	เฟื่องฟ้า	Bougainvillea spp. and hybrid					●	●		แดดเต็มวัน	เถาใหญ่แข็ง	-	-		●			●					●	ขาว แดง,ขาว,ชมพู, บานเย็น,ม่วงแดง	เขียว
ม	มลุลี, มะลิพวง	Jasminum multiflorum (Burm. f.) Andr.								แดดเต็มวัน	เถาเล็ก	-	-		●			●					●	ขาว	เขียว
ร	รสสุคนธ์ขาว	Tetracera loureiri (Finet&Gagnep.) Pierre ex Craib								แดดเต็มวัน	เถากลางแข็ง	-	-		●			●					●	ขาว	เขียวเข้ม
ล	เล็บมือนาง	Quisqualis indica L.	●				●	●		แดดเต็มวัน	เถาใหญ่แข็ง	-	-			●		●					●	ขาว,เมื่อแก่เป็นสีชมพูและแดง	เขียว

ชื่อต้นไม้		ชื่อวิทยาศาสตร์	ประเภทของต้นไม้							แสง	รูปทรง	ความสูง (ม.)	ขนาดพุ่ม (ม.)	การเจริญเติบโต			ใบ		ดิน					สีดอก	สีใบ
			ทนน้ำท่วม	ทนลม แรง	ทนแล้ง	ไม้ตัดแต่ง	ไม้ริมถนน	ไม้ริมทะเล	ทำลายสิ่งปลูกสร้าง					เช้า	ปานกลาง	เร็ว	พลัดใบ	ไม่พลัดใบ	ดินสมบูรณ์	ดินร่วน	ดินทราย	ดินเค็ม	ดินทั่วไป		
ส	สร้อยอินทนิล	Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb						●		แดดเต็มวัน	เถาใหญ่	-	-			●		●					●	ฟ้าเข้ม, ฟ้าอ่อน	เขียว
	สะแกวัลย์	Calycopteris floribunda Lamk.					●			แดดเต็มวัน	เถาเนื้อแข็ง	-	-		●		●						●	ครีม	เขียว
	สายน้ำผึ้ง	Lonicera japonica Thunb								แดดเต็มวัน	เถาเล็ก	-	-			●		●					●	เหลืองอมส้ม	เขียว
	สายหยุด	Desmos chinensis Lour.					●			แดดเต็มวัน	เถากลาง	-	-		●			●					●	เหลืองทอง	เขียวเข้มเป็นมัน
	แส	Jacquemontia pentantha (Jacq.) G.Don								แดดเต็มวัน	เถาเล็ก	-	-			●		●					●	น้ำเงินสดอมม่วง	เขียว
ห	หิรัญญิการ์	Beaumontia murtonii Craib								แดดเต็มวัน	เถาใหญ่	-	-		●			●					●	ขาว	เขียวเข้มเป็นมัน
อ	อรพิม	Bauhinia winitii Craib					●			แดดเต็มวัน	เถาใหญ่แข็ง	-	-		●		●						●	ขาว	เขียวอ่อน
	อัญชัน	Clitoria ternatea L.								แดดเต็มวัน	เถาเล็ก	-	-			●		●					●	น้ำเงินแก่ตรงกลางเหลือง	เขียว

คู่มือพืชพันธุ์ที่ใช้ในงาน

ภูมิทัศน์ทางหลวง

จัดทำโดย สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง กรมทางหลวง